

24136.

Beiträge
zur
Vergleichenden Anatomie
des
Durchlüftungssystems.

Mit 48 Textfiguren.

Inaugural-Dissertation,
der
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät
der
Universität Freiburg in der Schweiz
zur
Erlangung der Doktorwürde
vorgelegt von
Lic. phil. **P. Damian Buck**, O. S. B.
Stift Einsiedeln (Schweiz).



Druck der Verlagsanstalt Benziger & Co. A. G. in Einsiedeln,
Typographen des hl. Apostolischen Stuhles.
1902.

Beiträge
zur
Vergleichenden Anatomie
des
Durchlüftungssystems.


Mit 48 Textfiguren.

Inaugural-Dissertation,
der
mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät
der
Universität Freiburg in der Schweiz
zur
Erlangung der Doktorwürde
vorgelegt von

Lic. phil. **P. Damian Buck**, O. S. B.
Stift Einsiedeln (Schweiz).



Druck der Verlagsanstalt Benziger & Co. A. G. in Einsiedeln,
Typographen des hl. Apostolischen Stuhles.
1902.



Dem Hochwürdigsten Herrn
COLUMBANUS BRUGGER O. S. B.

Abt des Stiftes Einsiedeln

in Verehrung und Dankbarkeit

gewidmet vom Verfasser.

Einleitung.

Ursprünglich hatte ich die Absicht, eine vergleichend anatomische Untersuchung jener Pflanzengesellschaft zu liefern, welche in unsern Laubwäldern als Begleitpflanzen von *Fagus silvatica* aufzutreten pflegt. Doch hat sich die Fragestellung, wie es öfter geschieht, nach einer speziellen Richtung hin präzisiert. Vom frühern Plane trägt die hier vorliegende Arbeit noch insofern deutliche Spuren an sich, als vorwiegend Pflanzen aus der erwähnten Gesellschaft als Untersuchungsmaterial dienten.

Die ersten drei Kapitel enthalten nebst einer kurzen Zusammenfassung der bisherigen Forschungsergebnisse eine Ergänzung zur Kenntnis der Anatomie und Physiologie der Spaltöffnungsapparate; im vierten Kapitel sind speziell die Stomata an unterirdischen Organen behandelt, während das fünfte dem Schwammgewebe gewidmet ist.

Die Spaltöffnungsapparate sind bekanntlich seit Jahrzehnten der Gegenstand der anatomischen, später auch der physiologischen Forschung gewesen. Schon im Jahre 1856 übermittelte Mohl¹⁾ seine eingehenden Untersuchungen über die eigentümlichen Membranverdickungen der Schließzellen der Öffnungen; im Jahre 1857 erschien von Fr. Unger²⁾ eine Arbeit über

¹⁾ H. v. Mohl, Welche Ursachen bewirken die Erweiterung und Verengerung der Spaltöffnungen. Bot.-Ztg. 1856, p. 697 ff.

²⁾ Fr. Unger, Öffnen und Schließen der Spaltöffnungen. Beiträge zur Physiologie der Pflanzen. Sitzungsberichte der Wiener Akademie, Bd. 25. 1857.

das Öffnen und Schließen der Stomata, und N. J. C. Müller³⁾ veröffentlichte 1872 feine ausführlichen Studien über Anatomie und Mechanik der Spaltöffnung.

Genannte Autoren blieben aber bei der anatomischen Beschreibung der Spaltöffnungsapparate und bei der Tatfache des Öffnens und Schließens größtenteils stehen, ohne auf wichtige Fragen der Wechselbeziehungen zwischen Bau und Funktion näher einzugehen.

Ist es nun ganz allgemein ein Verdienst Schwendeners, die neuere, anatomisch-physiologische Forschung begründet zu haben, so bilden speziell feine im Jahre 1881 veröffentlichten Untersuchungen über den Bau und die Mechanik der Spaltöffnungen⁴⁾ eines der glänzendsten Resultate dieser neuesten Forschungsrichtung.

Wohl haben auch Schwendener und andere Forscher in Bezug auf die Stomata noch manche Frage offen gelassen. Zur Beantwortung einiger derselben möge der Hauptteil dieser Arbeit einen kleinen Beitrag liefern.

³⁾ N. J. C. Müller, Die Anatomie und Mechanik der Spaltöffnung. Pringsheims Jahrb. f. wissensch. Botanik, Bd. VIII. 1872.

⁴⁾ S. Schwendener, Über Bau und Mechanik der Spaltöffnungen. Monatsberichte der Berliner Akademie der Wissenschaften. 1881.

I. KAPITEL.

Die bis jetzt aufgestellten Typen; einige bemerkenswerte Modifikationen derselben; ein neuer Typus.

Die im Jahre 1881 durch Schwendener veröffentlichten Untersuchungen geben uns Aufschluß über verschiedene charakteristische Typen der Spaltöffnungen hinsichtlich ihres Baues und Mechanismus. Der genannte Autor behandelt zunächst den sogenannten *Amaryllis*-Typus (*Amaryllis formosissima*) (Fig. 1).




Fig. 1. Spaltöffnung von *Amaryllis formosissima* nach Schwendener.

Dieser Typus charakterisiert sich durch großlumige Schließzellen, deren Verdickungsleisten von geringen Dimensionen sind und auf der Bauchwandseite liegen, die Rückenwand ist von bedeutender Ausdehnung und zart und dünn. Im Princip stellt eine derart gebaute Schließzelle eine einseitig verdickte Kautschukröhre dar und das Hauptmoment beim Öffnen des Spaltöffnungsapparates liegt in der starken Ausdehnung der

Rückenwand und in der dadurch bedingten Krümmung der Schließzellen. Sowohl der Vor- als auch der Hinterhof verändert sich beim Öffnen und beim Verschluß. Betreffs der Vorhofmündung sagt Schwendener, daß sie sich gewöhnlich nie ganz schließe, sondern sich bloß verengere oder erweitere. Die Gesamtbreite ist im geöffneten Zustande größer als im geschlossenen.

In dieser Beziehung zeigt der zweite Typus, den Schwendener bespricht, nämlich der *Tradescantia*-Typus (Fig. 2) ein anderes Verhalten.




Fig. 2. Spaltöffnung von *Smilacina bifolia* (Blatt).

Hier wird nämlich der Schließzellapparat bei mäßigem Turgor nicht breiter, sondern im Gegenteil kontrahiert. Schwendener im spannungslosen Zustande eine größere Breite. Wiewohl die Form und Lage der Verdickungsleisten im allgemeinen dieselbe ist wie bei dem zuerst erwähnten Typus, so ist dennoch der Mechanismus ein anderer. Diese Änderung des Mechanismus hat ihren Grund in der geringern Ausdehnung der Rückenwand und vor allem in dünnen Stellen (a und b) der äußern und innern Verdickungsleiste, worüber weiter unten nähere Erörterungen folgen werden. Diese anatomischen Verhältnisse bringen es mit sich, daß das Hauptmoment beim Öffnungsvorgange in der Ausdehnung der Schließzellen senkrecht zur Blattfläche liegt; dadurch tritt die Bauchwand zurück, während umgekehrt beim Nachlassen des Turgor das Hervorwölben der Bauchwand in den meisten Fällen einzig den Verschluß herstellt.

Ein weiterer, dritter Typus, den Schwendener studierte, ist der *Helleborus*-Typus (*Helleborus foetidus*) (Fig. 3).




Fig. 3. Schließzellen von *Helleborus foetidus* (Blatt) nach Schwendener.

Er schreibt von ihm: „Das Charakteristische der Schließbewegung liegt bei *Helleborus* darin, daß die Vorhofweite, wenigstens bei mäßigem Druck, konstant bleibt, der Hinterhof dagegen nahezu um die doppelte Breite der Centralspalte schmaler wird, während zugleich die Rückenwände der Schließzellen sich stärker wölben und um ihre äußern Ansatzlinien drehen, wie Flügeltüren um ihre Angeln“. ¹⁾ *)

Dieser Vorgang ist aus der bekannten Fig. 3 von Schwendener leicht zu verstehen. Wir sehen daraus ferner, daß die Verdickungsleisten der Schließzellen nicht mehr mit denjenigen der bereits besprochenen Typen übereinstimmen; während die äußere Verdickungsleiste im Querschnitte in der Regel die Dreieckform zeigt, stellt die innere annähernd ein Trapez

*) Die erste Hälfte dieses Satzes bezieht sich selbstverständlich auf die Schließbewegung, hingegen wird sich die zweite Hälfte nach meiner Ansicht auf den Öffnungsvorgang beziehen müssen und der Schluß betreff der Scharnierbewegung auf beide Vorgänge zugleich.

dar. Die mechanischen Hauptmomente beim Öffnungsvorgange liegen in der scharnierartigen Bewegung der dünnen Bauchwandstelle und der Verwachsungsstelle der Rückenwände mit der Epidermisaußenwand, und in der Wölbung der Rückenwand.

Als vierten Typus stellte Schwendener 1889 den Spaltöffnungsapparat der *Gramineen* auf (Fig. 4).




Fig. 4. Spaltöffnung von *Poa annua*. A Oberflächenansicht, B Querschnitt durch ein erweitertes Ende, C Querschnitt durch das Mittelfstück des Apparates, nach Haberlandt.

Die Gestalt der Schließzellen bei den *Gramineen* ist hantelförmig. Die äußern und innern Verdickungsleisten nehmen in dem gestreckten Mittelteile der Spaltöffnung fast die ganze Zelhöhlung der Schließzellen ein und lassen nur ein schmales, querpaltenförmiges Lumen übrig; nach den Polen hin verlieren sie ihre Mächtigkeit, zudem erweitert sich hier die Schließzelle zu einem dünnwandigen Ballon. Beim Erhöhen des Turgors dehnen sich diese erweiterten Schließzellenden aus und treiben die starkentwickelten Verdickungsleisten parallel mit sich selber auseinander.

Haberlandt fand bei den Spaltöffnungen der Kapfel von *Mnium cuspidatum* einen neuen, fünften Typus, der in Bau und Mechanismus von den Schwend-

nerifchen Typen abweicht (Fig. 5). Wenn wir den Querschnitt durch eine folche Spaltöffnung betrachten, fo fällt uns zunächft die ftarke Verdickung der Rückenwand und die geringe Entwicklung der innern Verdickungsleisten auf, fowie die große Ausdehnung und Zartheit der Bauchwand.

Beim Öffnungsprozefse ift hier zum vorneherein ein Ausbiegen der Rückenwand oder eine Krümmung der Schließzellen ausgefchloffen. Die Funktion des Öffnens und Schließens beruht hier einzig auf der Veränderung des Querschnittlumens und der daraus folgenden Abflachung, beziehungsweise Wölbung der dünnen Bauchwand. Das Lumen ift, vom Pole aus




Fig. 5. Spaltöffnung von *Mnium cuspidatum* im gefchloffenen und offenen Zustande, nach Haberlandt.

betrachtet, im Zustande der Spannung annähernd kreisförmig, im spannungslosen Zustande hat es eine ellipfoide Form²⁾. Im Anschlusse an die Forschungen Haberlandts veröffentlichte Büniger³⁾ 1890 die Ergebnisse feiner Unterfuchungen über die Spaltöffnungen verschiedener Laubmooskapfeln. Die meisten der hier behandelten Stomata zeigen in Bau und Mechanismus große Ähnlichkeit mit denjenigen von *Mnium cuspidatum* (Fig. 5) und *Oleandra neriiifolia* (Fig 15). Hingegen zeichnen sich die Schließzellen von *Polytrichum gracile* (Fig. 6) durch einen ganz eigenartigen Bau

aus. Besonders auffallend ist die starke Verdickung ihrer Bauchwände. Das Öffnen geht nach Bün ger folgendermaßen vor sich: «Der hydrostatische Druck wirkt nach allen Seiten gleichmäßig auf eine Ab- rundung des Lumens. Bei der vorliegenden Quer- schnittform kann das nur in der Weise geschehen, daß die langen, nahezu geraden Wände etwas nach außen gebogen werden. Dadurch geht die lang dreieckige Form des Lumens in eine lang elliptische oder ovoi- difche über.»




Fig. 6. Spaltöffnung von *Polytrichum gracile*, nach Bün ger.

Wiederum abweichend von den bisher aufgestellten Typen sind die Öffnungs- und Schließungsvorgänge bei den Stomata der *phanerogamen* Schwimmpflanzen, die ebenfalls von Haberlandt studiert wurden. Es ist das ein sechster Typus (Fig. 7).



Fig. 7. Spaltöffnung von *Trianea bogotensis* nach Haberlandt.

Hier können wir nicht von Vor- und Hinterhof und Centralspalte sprechen, wir haben nur eine äußere Hörnchenfalte und gleich unter dieser erweitert sich der Luftkanal trichterförmig nach innen gegen die Atemhöhle hin. Der Spaltenverschluß geschieht durch die mehr oder minder vollkommene, gegenseitige An- näherung der starkentwickelten äußern Hörnchen.⁴⁾

Als letzten, fiebenten, der bis jetzt aufzustellenden Typen möchte ich den durch Schellenberg⁵⁾ an *Iris germanica* gefundenen erwähnen (Fig. 8). Ich bin vollständig der Ansicht von Westermaier, daß einerseits der Bau und Mechanismus des Spaltöffnungsapparates von *Iris germanica* ein vom *Helleborus*-Typus wesentlich verschiedener ist, daß er aber anderseits in den wichtigsten Punkten mit den *Koniferen*spaltöffnungen übereinstimmt.




Fig. 8. Spaltöffnung von *Iris germanica* nach Schellenberg.

Denn weder Form noch Lage der Verdickungsleisten, noch das gänzliche Fehlen eines Vorhofes ist mit dem *Helleborus*-Typus vereinbar. Eine Übereinstimmung mit dem *Helleborus*-Typus ist nur darin zu finden, daß es sich in beiden Fällen beim Öffnungsprozesse um eine Veränderung des Querschnittlumens handelt, daß das Lumen vom ungleichseitig-stumpfwinkeligen annähernd in ein gleichschenkliges Dreieck übergeht. Doch ist die Lage und Ausdehnung der Grundlinie und das Verhältnis der Grundlinie zu den beiden Schenkeln nach erfolgtem Turgor nicht in beiden Fällen übereinstimmend, wie aus der schematischen Fig. 9 zu ersehen ist.

Die in der Skizze am stärksten ausgezogene Grundlinie des gleichschenkligen Dreieckes wird bei *Helleborus* durch die Rückenwand und bei *Iris germanica* durch die der Atemhöhle zugekehrte Seite gebildet.




Fig. 9. a. Schematische Darstellung der Lumenveränderung des *Helleborus*-, b. des *Iris*-Typus.

Bei meinen Untersuchungen fand ich nun, was schon Schwendener und Haberlandt bemerkten, daß zwischen den einzelnen charakteristischen Typen in Bezug auf die Form, Dimension und Anordnung der Verdickungsleisten die verschiedensten Abstufungen vorkommen können; daß z. B. die zarten, wenig entwickelten Verdickungsleisten, wie sie der echte *Amaryllis*-Typus zeigt, immer größere Dimensionen annehmen können, bis sie die Mächtigkeit derjenigen des *Tradescantia*-Typus erreichen, und wiederum findet man im Querschnitt die Dreieckform der inneren Verdickungsleiste des *Tradescantia*-Typus in den mannigfachsten Abstufungen, bis man endlich bei *Helleborus* die Trapezform trifft, welche diesem Typus eigen ist. Parallel mit den Formveränderungen der Verdickungsleisten geht selbstverständlich die Zu- oder Abnahme der dünnen Wandstellen der Schließzellen.

Trotz dieser großen Mannigfaltigkeit der Querschnittsformen bleiben die aufgestellten Typen bestehen und die meisten neu untersuchten Stomata lassen sich in Bezug auf Bau und Mechanik einem der bekannten Typen unterordnen. Doch haben meine Untersuchungen

nich dazu bestimmt, zuerst von einigen Modifikationen bereits aufgestellter Typen zu sprechen, und schließlich einen neuen Typus aufzustellen.

Im ersten Fall sind einerseits die Verschiedenheiten nicht so wesentlich, um einen neuen Typus aufstellen zu können, anderseits aber doch wichtig genug, um sie als Modifikation neben dem eigentlichen Typus zu erwähnen. Ich gehe nun zur Besprechung einer ersten Modifikation über.

Bekanntlich liegt nach Schwendener das charakteristische Merkmal der Schließbewegung bei *Helleborus* darin, daß der Vorhof bei mäßigem Druck unverändert bleibt, daß also beim Verschluß der Centralspalte die äußern Hörnchen sich nicht berühren.

Allein bei einer nicht geringen Anzahl *dicotyler* Pflanzen, deren Spaltöffnungen im Querschnitt das Bild vom *Helleborus*-Typus zeigen, führte eine eingehendere Untersuchung zum Ergebnis, daß der Vorhof beim Spaltenverschluß nicht unverändert bleibt, sondern sich verengert und zwar in vielen Fällen so, daß die Hörnchen spitzen sich berühren.

So treten die äußern Hörnchen bei der Schließbewegung, wenn auch hie und da nicht ganz, so doch in der Regel sehr nahe zusammen bei folgenden Pflanzen: *Phyteuma spicatum* (Blatt und Stengel), *Vinca minor* (Blatt und Stengel), *Galium Mollugo* (Blatt und Stengel), *Asperula odorata* (Blatt und Stengel), *Mercurialis perennis* (Blatt und Stengel), *Orobus vernus* (Stengel), *Pulmonaria montana* (Stengel), *Hedera Helix* (Blatt), *Daphne Mezereum* (Blatt), *Anemone nemorosa* (Stengel), *Onobrychis fativa* (Stengel und Unterseite des Blattes), *Fragaria elatior* (Stengel und Ausläufer), *Plantago maior* (Blatt), *Mahonia aquifolium* (Blatt) etc. (Fig. 10).




Fig. 10. Spaltöffnung von *Phyteuma spicatum* (Blatt).

Wenn nun aber beim Spaltenverschluß ein Berühren der äußern Hörnchen stattfindet, ist der Bewegungsvorgang nicht mehr ganz derselbe wie beim echten *Helleborus*-Typus.

Die zunächst zu besprechenden drei Fälle fallen unter den gleichen Gesichtspunkt; sie sind indes in Bezug auf den Öffnungsvorgang unter sich nicht vollständig übereinstimmend und deshalb besonderer Erwähnung wert.

Betrachten wir den Querschnitt durch eine Spaltöffnung des Ausläufers von *Fragaria elatior*, so lassen sich die Bewegungsvorgänge des Öffnens und Schließens aus der nebenstehenden Figur leicht erkennen (Fig. 11). Es ist dies der einfachste Fall und auch häufig zu finden.

Die Schließzellen sind an ausgeprochenen äußern



Fig. 11. Spaltöffnung von *Fragaria elatior* (Ausläufer).

und innern Gelenken gleichsam aufgehängt. In erster Linie biegt sich im Zustande der Spannung die dünne Rückenwand aus, dann wird durch ihre Krümmung ein Zug in derselben Richtung auf die zarten äußern und innern Gelenke ausgeübt und die Öffnung kommt

zustande. Ganz gleich verhalten sich auch die Spaltöffnungen des Stengels von *Vinca minor*.

Vergleichen wir damit die Spaltöffnungsapparate und ihre Bewegungsvorgänge im Blatt von *Vinca minor* (Fig. 12).




Fig. 12. Spaltöffnung von *Vinca minor* (Blatt).

Hier ist das äußere Gelenk nur schwach entwickelt, die Membran der Nachbarzelle schließt genau horizontal an die Schließzelle, ohne eine Krümmung nach außen zu beschreiben; die Rückenwand ist von geringerer Ausdehnung, so daß ihre stärkste Ausbiegung allein den offenen Zustand nicht zu bewerkstelligen vermöchte. Dafür ist aber das innere Gelenk gut ausgebildet.

Soll nun unter diesen mechanischen Verhältnissen dennoch eine Öffnung zustande kommen, so wird nach eingetretenem Turgor zunächst die dünne Rückenwand sich nach rückwärts ausdehnen und zugleich das innere Gelenk in Funktion treten. Doch diese beiden Bewegungen würden nicht genügen, um die äußern Hörnchenspitzen von einander zu trennen. Man könnte deshalb unter den gegebenen mechanischen Anordnungen ein Einwärtsbiegen, ein Senken der beiden Schließzellen gegen die Atemhöhle hin annehmen.

Eine Bekräftigung dieses Gedankens war für mich die Betrachtung des Querschnittes einer Spaltöffnung von *Hedera Helix* (Blatt). (Fig. 13.)

Diese Stomata besitzen ausgeprochene Außengelenke, die jedenfalls funktionsfähig sind und beim




Fig. 13. Spaltöffnung von *Hederu Helix* (Blatt).

Öffnungsprozeßie auch in Anspruch genommen werden. Da die Ausdehnung der Rückenwände im turgeszenten Zustande schief nach innen, in der Richtung der Pfeile geschieht, so wird auch die Schließzelle in dieser Richtung einen Zug erfahren und an eine Bewegung derselben nach außen kann nicht gedacht werden, ebenso wenig an ein direktes Zurücktreten derselben in horizontaler Richtung, denn dazu bietet die dicke Epidermisaußenwand einen zu großen Widerstand.

Wenn ich daher den äußern Gelenken eine Funktion nicht absprechen will, so muß ich beim Öffnen der Stomata ein Senken der Schließzellen nach innen, gegen die Atemhöhle zu, annehmen, bei welcher Bewegung das äußere Gelenk als Scharnier funktioniert. Leider war es mir trotz vieler Versuche nicht möglich, auf dicken Querschnitten offene Apparate zu bekommen, um direkt an solchen die Beobachtungen und Messungen zu machen. Doch gestützt auf die grundlegenden Arbeiten Schwendeners über den Öffnungsmechanismus der Spaltöffnungen glaube ich obige Schlüsse ziehen zu dürfen.

Wie wir gesehen, stimmen die Bauverhältnisse der Spaltöffnungen von *Fragaria elatior* (Ausläufer), *Vinca*

minor (Blatt) und *Hedera Helix* (Blatt) infofern überein, daß die Gestaltung der Verdickungsleisten dem *Helleborus*-Typus entspricht; ferner verhalten sich die drei Apparate gleich in Bezug auf das Berühren der äußern Hörnchen im geschlossenen Zustande, im Gegensatz zu *Helleborus*, und dennoch ist ein Unterschied im Öffnungsmechanismus auch zwischen ihnen infolge verschiedener Lage der Schließzellen und Anordnung der Gelenke, wie aus den obigen Darlegungen ersichtlich, nicht zu verkennen.

Eine zweite Modifikation des *Helleborus*-Typus fand ich in der Familie der *Papilionaceen*. Die Spaltöffnung auf der Blattoberseite von *Onobrychis fativa* (Fig. 14) zeigt nämlich etwelche Ähnlichkeit in Bau und Mechanik mit derjenigen von *Iris germanica*.



Fig. 14. Spaltöffnung von *Onobrychis fativa* (Blattoberseite).

Es neigen hier die äußern Partien der Schließzellen ebenfalls gegen einander; der Vorhof ist verschwindend klein, der Hinterhof bedeutend größer und erweitert sich trichterförmig gegen die Atemhöhle hin. Doch ist die schiefe Lage der Schließzellen nicht so ausgeprägt und die Streckung derselben in der schiefen Richtung nicht so auffallend wie bei denjenigen von *Iris germanica*. Es wird auch hier beim Eintreten des Turgor die Rückenwand sich ausdehnen und eine ähnliche Lumenquerschnittsveränderung hervorbringen, wie bei *Helleborus*. Diese Art des Mechanismus steht also zwischen demjenigen der Stomata von *Helleborus* und *Iris germanica*. — Im folgenden Absatz soll eine dritte Modifikation besprochen werden.

Bei der *Gefäßkryptogame Oleandra neriifolia* fand ich einen Spaltöffnungsapparat, der mehr durch seine Funktion als durch seinen Bau an den von Haberlandt an der Kapfel von *Mnium cuspidatum* entdeckten erinnert, dennoch aber in wichtigen Punkten von diesem abweicht, so daß er neben ihm erwähnt werden muß.

Es ist sicher, daß man, seit Schwendener die mechanischen Principien bei der Funktion der Schließzellen festgestellt hat, in vielen Fällen einzig aus den Bauverhältnissen der Schließzellen auf den Öffnungsmechanismus schließen kann. So ist es auch hier der Fall. Wiewohl mir nur Alkoholmaterial zu Gebote stand, glaube ich dennoch aus der Konstruktion der Schließzellen den Öffnungsvorgang, wie er im folgenden dargelegt wird, richtig erkannt zu haben.

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Flächenansicht (Fig. 15 a), so beobachten wir, daß diese Spalt-




Fig. 15. a. Flächenansicht, b. Querschnitt der Spaltöffnung von *Oleandra neriifolia*.

öffnung rings mit einem starken Walle umgeben ist, der zum Teil von der Epidermisaußenwand, zum Teil

von einer dicken Radialwand gebildet wird, wie aus dem Querschnitte zu ersehen ist (Fig. 15 b).

Die Form und Lage der Verdickungsleisten entsprechen dem *Tradescantia*-Typus. Die dünne Bauchwand ist von sehr geringer Ausdehnung; die äußere und innere Verdickungsleiste nimmt gegen die Rückenwand hin ab, so daß die innere und äußere Schließzellmembran hier dünne Stellen von beträchtlicher Ausdehnung aufweist. Soll der Apparat sich öffnen, so dehnt der eingetretene Turgor die beiden dünnen Membranstellen fenkrech zur Richtung der Blattfläche, die Schließzelle wird an Höhe zunehmen, die dünne Bauchwandstelle als Scharniere funktionieren, der spitze Winkel des Lumens sich erweitern und das Lumen eine rundlich birnenförmige Gestalt annehmen, wie es Fig. 15 b zeigt. Es ist selbstverständlich, daß hier wie bei den Stomata von *Mnium cuspidatum* an ein Breiterwerden des Schließzellapparates im turgeszenten Zustande nicht zu denken ist.

Es sollen hier als vierte Modifikation die Spaltöffnungen von *Smilax mauritanica* (Fig. 30) kurz erwähnt werden, welche infolge der Dimensionen der Verdickungsleisten dem *Tradescantia*-Typus zugeordnet werden müssen; hingegen sind sie infolge der Wandanfätze — in der Mitte der innern Verdickungsleiste — als eine kleine Modifikation des betreffenden Typus hervorzuheben.

In feiner Schrift: «Zur Kenntnis des Spaltöffnungsapparates» ⁶⁾ beschreibt uns Haberlandt «gewisse Besonderheiten des Baues der Spaltöffnungen solcher Pflanzen, welche nassen Standorten angepaßt sind oder in einem überaus feuchten Klima leben.»

Tatsächlich kommen aber, wie wir gleich sehen werden, derart gebaute Stomata nicht nur bei *phane-*

rogamen Schwimmpflanzen, sondern selbst bei Pflanzen trockener Standorte und Klimate vor. Und diese Spaltöffnungen möchte ich als eine fünfte Modifikation hervorheben.

Als ich das Blatt von *Primula elatior* untersuchte, fand ich auch auf der Oberseite zahlreiche Stomata. Im Flächenansichte sind sie wie diejenigen der Unterseite von isodiametrischer Form (Fig. 16 a). Auf der



Fig. 16, Spaltöffnung von *Primula elatior* (Blattunterseite), a. Flächenansicht (offen), b. Querschnitt.

Blattunterseite beobachtete ich zahlreiche offene Apparate und wollte sie durch Zusatz von Glycerin zum Schließen bringen, was mir aber scheinbar nicht gelang, denn stets zeigte sich die offene Centralspalte auf dem Flächenansichte als hellbelichtete Linse, wenn sie auch etwas schmaler geworden war, als vor dem Zusatz des Glycerins. Erst als ich den Querschnitt ins Auge faßte, war für mich das Rätsel gelöst, und erst dann konnte ich mir auch richtig die Linien des Flächenansichtbildes erklären. Zu meiner Überraschung vollzog sich nämlich der Spaltenverschluß hier nur durch die äußern Hörnchen, nicht aber zugleich auch durch die Bauchwände. Wir haben also bei dieser Pflanze trockenen Standortes einen ganz ähnlichen Spaltöffnungsverschluß, wie bei gewissen Schwimmpflanzen (Fig. 16 b). Bei höchster Einstellung des Objektes bemerkte ich dann auch im Flächenansichte die

feine Verschlußlinie, welche durch das Zusammentreten der Hörnchen gebildet wird. Die Linien auf dem Flächenschnitte (Fig. 16 a) erklären sich in folgender Weise: aa ist die Cuticular-, bb die Hörnchenpalte (äußere) und die punktierte Linie die Centralpalte. Nebenbei sei noch bemerkt, daß hier im Gegensatz zu dem Schwimmpflanzentypus auch innere Hörnchen vorhanden sind, daß man überhaupt unterscheiden kann zwischen Vor- und Hinterhof und Centralpalte.

Ist Turgor vorhanden, und beobachtet man den Apparat vom Pole aus, so weist das Lumen fast kreisrunde Form auf, die Schließzellen sind höher geworden und biegen sich nach außen hin etwas zurück, eine Folge der Ausdehnung der dünnen Stellen in der äußern Schließzellwand, welche Bewegung noch durch den Umstand erleichtert wird, daß die Schließzellen etwas über das Niveau der zarten Epidermisaußenwand erhoben sind. Sobald die Spannung nachläßt, neigen sich die beiden Schließzellen gegen einander, die Höhe derselben nimmt ab und das Lumen nähert sich der ellipsoiden Form.

Es ist noch hervorzuheben, daß die Spaltöffnungen der Blattoberseite nicht durchgehends diesen Spaltenverschluß zeigen; im Gegenteil bei der Großzahl der Stomata berühren sich die Bauchwände; es findet also ein doppelter Verschluß sowohl durch die Hörnchen als auch durch die Centralpalte statt (Fig. 17).



Fig. 17. Spaltöffnung der Blattoberseite von *Primula elatior*.

Ganz gleich verhält es sich auch bei *Primula officinalis*. Auf der Blattunterseite nämlich finden sich

nur solche Stomata, welche ihren Verschluß durch die äußern Hörnchenspitzen bewerkstelligen, während die Centralspalte stets offen bleibt; auf der Oberseite finden wir auch gleichgebaute Apparate, bei der Mehrzahl jedoch kommt der Verschluß nicht nur durch das Zusammentreten der äußern Hörnchen, sondern auch durch die dünnen Bauchwandstellen zu stande.

Ähnlich gebaute Spaltöffnungen zeigt das Blatt von *Ranunculus acer*. Auch hier finden sich solche Stomata, bei denen das Schließen nur durch die äußern Hörnchen vor sich geht; die meisten jedoch schließen sich infolge Zusammentretens der Bauchwände und der äußern Hörnchen.

Hier hatte ich besonders gute Gelegenheit sowohl von der Fläche als auch vom Pole aus zu beobachten, wie turgescente Spaltöffnungsapparate in den spannungslosen Zustand übergehen. Wie aus Fig. 18 a, b und c zu ersehen ist, stimmen die Schließzellen in Bezug auf Bau und Anordnung der Verdickungsleisten, ebenso auch in Bezug auf ihre Lage zur Epidermis mit denjenigen von *Primula* überein, nur sind die innern Hörnchen noch weniger ausgebildet, als bei den Schließzellen der eben genannten Pflanze.

Um die Bewegungsvorgänge beim Öffnen und Schließen dieser Spaltöffnungen besser beurteilen zu können, führe ich nachstehende Messungen an.

a. Messungen auf Flächenschnitten:

	Offen:			Geschlossen:		
	I.	II.	III.	I.	II.	III.
Gesamtbreite	18	19	20	17	18	19 ¹ / ₂
Cuticularspalte	5	6	6	3	3	3
Äußere Hörnchenpalte	1	2	1 ¹ / ₂	0	0	0
Centralspalte	3	4	4	1 ¹ / ₂	0	1 ¹ / ₂
Länge der Spaltöffnung	24	23	23	22	22	22

b. Messungen an dicken Querschnitten:

	Offen:			Geschlossen:		
	I.	II.	III.	I.	II.	III.
Gesamtbreite	19	18	18	18	16 $\frac{1}{2}$ -17	17
Breite der I. Schließzelle	8 $\frac{1}{2}$	7	7	9	7 $\frac{1}{2}$ -8	8
Breite der II. Schließzelle	8	7 $\frac{1}{2}$	7	9	8 $\frac{1}{2}$	9
Centralpalte	2 $\frac{1}{2}$	3 $\frac{1}{2}$	4	0	1 $\frac{1}{2}$	0
Äußere Hörnchenpalte	3	3	5	0	0	0
Höhe der I. Schließzelle	9 $\frac{1}{2}$	8 $\frac{1}{2}$	7	8 $\frac{1}{2}$	7	6
Höhe der II. Schließzelle	9 $\frac{1}{2}$	8	7	8 $\frac{1}{2}$	7	6

Aus diesen Messungen ist zu ersehen, daß die Gesamtbreite des Spaltöffnungsapparates während seiner Funktion sich nur wenig verändert, bedeutender aber die Bauchwandseite. So machen z. B. die Bauchwände beim Schließen einen Weg von 4 Teilstrichen Abstand bis auf 0, ebenso die äußern Hörnchen von 3 auf 0, während die Gesamtbreite nur um einen Teilstrich sich verändert.

Die Hauptmomente des Verschlusses liegen also in dem Vorbeugen der Schließzellen gegen einander und in der Lumenveränderung, wobei die Breite der einzelnen Schließzelle zu- und ihre Höhe abnimmt; zugleich wölben sich die dünnen Bauchwände und rücken gegeneinander bald bis zur gegenseitigen Berührung (Fig. 18 b), bald aber auch nicht so weit




Fig. 18. Spaltöffnungen von *Kanunculus acer* (Blatt), a und b geschlossene Spaltöffnungen, c offene Spaltöffnung.

(Fig. 18 a). Der Hauptdrehpunkt liegt an der Ansatzstelle der äußern Epidermiswand an die Schließzelle.

Wenn wir nun fragen, welche physiologische Bedeutung dem Spaltöffnungsverschluß, der sich einzig durch das Zusammentreten der äußern Hörnchen vollzieht, bei Landpflanzen zukomme, so darf als Antwort die Erklärung *Haberlandts*'), die er auf die Schwimmpflanzen anwendet, auf diese eben erwähnten Fälle natürlich nicht übertragen werden.

Er sagt, daß dieser Verschluß bei gewissen Schwimmpflanzen eine Schutzvorrichtung gegen kapillare Wasserstopfung sei. Aber gerade auf der Oberseite des Blattes von *Primula elatior* und *officinalis*, wo in dieser Hinsicht größere Gefahr wäre, sind nur wenige Stomata mit diesem Verschluß, während sie ihn auf der Unterseite durchgehends besitzen.

Es ist vielleicht der Verschluß einzig durch die Hörnchen als der leichteste und lockerste zu bezeichnen, derjenige durch die dünnen Bauchwandstellen wäre der dichtere und endlich derjenige, wo beide Momente zusammentreffen und dazu vielleicht die innern Hörnchen sich auch noch berühren, der am meisten hermetische.

Wenn auch dieser Erklärungsversuch die Tatsachen, wie sie bei *Primula elatior* und *officinalis* vorliegen, uns verständlich macht — denn bekanntlich sind die Blätter nahe an der Erde ausgebreitet — so bleibt dennoch der Fall, wie wir ihn bei *Ranunculus acer* finden, uns dunkel, denn diese Pflanze lebt sehr oft nicht an feuchten Standorten und ihre Blätter sind nicht dem Boden anliegend.

Mag man daher auch annehmen, daß die Funktion der äußern Hörnchen einerseits ein Schutz gegen Verstopfung durch Pilze, Wasser etc., anderseits Verstärkung

des Spaltenverschlusses sei, so ist dennoch ihre physiologische Bedeutung noch immer nicht vollständig klar.

Vollends eigener Art sind die Stomata im Stengel von *Ranunculus acer*, so daß ich sie weder zum *Tradescantia*-, noch zum *Helleborus*-, noch zu irgend einem andern Typus rechnen möchte.

Um aber von einem neuen Typus sprechen zu können, müssen von den bereits aufgestellten Typen wesentliche Abweichungen in Bau und Mechanik der Schließzellen vorhanden sein. Für wesentliche Elemente, welche einen Typus bilden können, halte ich in erster Linie Form und Lage der Verdickungsleisten, nach deren Übereinstimmung oder Verschiedenheit im allgemeinen sich auch der Mechanismus gestaltet, und damit im Zusammenhang halte ich ebenfalls für entscheidend das Vorhandensein oder den gänzlichen Mangel an innern und äußern Gelenken.

In den bis jetzt besprochenen Fällen fanden wir bei dicker Epidermisaußenwand entweder ein inneres oder äußeres Gelenk oder dann dünne Stellen in den Schließzellwänden, welche uns den Mechanismus des Öffnens und Schließens verständlich machen.

Anders verhält sich die Sache bei der Spaltöffnung von *Ranunculus acer*. Sie liegt im gleichen Niveau mit der Epidermisaußenwand. Die Verdickungsleisten sind von ansehnlicher Mächtigkeit, vor allem die innere, welche Rechteckform zeigt, während die äußere mehr einem Dreiecke ähnlich ist. Die äußern Hörnchen sind etwas stärker ausgebildet als die innern. Innere Gelenke fehlen nicht bloß gänzlich, sondern die an die Verdickungsleiste angrenzende Innenwand der Nachbarzelle ist eher noch von größerer Dicke, als die innere Membran der Schließzelle

(Fig. 19); ebenso fehlen auch äußere Gelenke im strengen Sinne des Wortes, denn Außengelenk heißt man bekanntlich einen verdünnten Membranstreifen in der Außenwand der Nachbar- nicht der Schließzelle, der als Scharnier funktioniert. Allerdings findet sich neben der äußern Verdickungsleiste gegen die Rückenwand hin ein dünner Membranstreifen, der aber der Schließzelle selber angehört. Unter jedem Spaltöffnungsapparat zeigt sich eine geräumige Atemhöhle, die von dünnwandigen Zellen begrenzt wird.

Betrachten wir auf einem medianen Querschnitte (Fig. 19) einen geschlossenen Apparat, so ist auf den ersten Blick schwer zu begreifen, wie bei diesen sehr dicken Epidermiswänden, bei gänzlichem Fehlen von Gelenken, ein Öffnen der Centralpalte zustande kommt. Und dennoch können wir sowohl auf Flächen- als auch auf dicken Querschnitten viele offene Stomata finden und zwar so weit offen, daß der Abstand der beiden Bauchwände und ebenso derjenige der innern und äußern Hörnchen kein geringer ist.




Fig. 19. Spaltöffnung von *Ranunculus acer* (Stengel).

Bei den offenen Stomata hat das Lumen eine rundliche Form, welche dadurch zustande kommt, daß die Rückenwand nach außen gewölbt wird, ebenso die

dünne Stelle in der äußern Schließzellmembran, aber auch die mäßigen Teile der Verdickungsleisten biegen sich ein wenig und tragen so zur Abrundung des Lumens bei. In diesem Zustande erscheinen die Rücken- und Bauchwände der Schließzellen auf dicken Querschnitten, vom Pole aus gesehen, in annähernd senkrecht aufrechter Lage, während die Rückenwände nach aufgehobenem Turgor in der Regel eine zu einander schief geneigte Stellung einnehmen, wie aus der Fig. 19 (Schließzelle links) zu ersehen ist.

Als ich durch Zusatz von verdünntem Glycerin solche offene Stomata langsam zum Schließen brachte, ließ sich zunächst eine Veränderung des Lumenquerschnittes wahrnehmen, wobei die rundliche Form in die mehr dreieckige überging; zugleich bewegte sich deutlich die dicke angrenzende Innenwand der Nachbarzelle und zwar von innen nach außen in der Richtung des punktierten Pfeils (Fig. 19). Diese Bewegung von innen schief nach außen ist so stark, daß, wie bereits erwähnt, die Rückenwände in eine schiefe Lage kommen und die innern Hörnchen fast ganz zusammenrücken.

Diese Tatsache drängt zum Schlusse, daß durch den Turgor auf irgend eine Art ein Zug nach Innen ausgeübt wird. Und dies ist möglich durch die Turgorausdehnung der dünnwandigen, die Atemhöhle begrenzenden Zellen. Zwischen diesen Zellen finden sich da und dort erhebliche Interzellularräume (Fig. 19 i), wodurch die Dehnung erleichtert und der Zug nach innen in der Richtung der Pfeile begünstigt wird. Diese Veränderung der Atemhöhle, nämlich ein Auseinandergehen der dünnwandigen Zellen bei eintretendem und ein Zusammenrücken bei aufgehobenem Turgor wurden auch durch Messungen bestätigt. Ich

machte die Messungen an umgekehrten Flächenchnitten, also von der untern Seite und zwar mitten quer über die Spaltöffnung. Es ergaben sich folgende Zahlen: Weite der Atemhöhle während des Turgors: 11; 11; 14; Weite der Atemhöhlen nach aufgehobenem Turgor: 8; 8; 12.

Mit der Lumenveränderung beim Verschluße des Apparates geht Hand in Hand das Vorwölben der Bauchwand.

Um den Überblick über die Bewegungsvorgänge beim Öffnen und Schließen dieser Stomata zu erleichtern, führe ich noch folgende Messungen an, die an Flächenchnitten gemacht wurden:

	Offen:			Geschlossen:		
	I.	II.	III.	I.	II.	III.
Gesamtbreite der Spaltöffnung	17 $\frac{1}{2}$ -18	16 $\frac{1}{2}$	15	17	16	14
Cuticularpalte	2	1 $\frac{1}{2}$	1	0	0	0
Äußere Hörschenpalte	6	4-4 $\frac{1}{2}$	4 $\frac{1}{2}$ -5	4	3	3
Centralpalte	2 $\frac{1}{4}$	2	1 $\frac{1}{2}$	0	0	0
Länge der Spaltöffnung	30	27	27	30	26	27

Die Gesamtbreite der Spaltöffnung verändert sich also nur wenig; die Bewegung der Bauchwände ist nicht bedeutend, doch immerhin merklicher als die der Rückenwände. Die Cuticularpalte hat bei offener Spaltöffnung ungefähr die gleiche Breite, wie die Centralpalte und verengt sich beim Verschluß ganz.

Die Bewegungsvorgänge beim Öffnen und Schließen dieser Stomata vollziehen sich also nach obenstehender Ausführung folgendermaßen: Soll sich ein geschlossener Apparat öffnen, so bewirkt der Turgor das Ausbiegen der Rückenwand und des dünnen Membranstreifens an der äußern Verdickungsleiste, zugleich erfolgt auch der Zug schief nach innen, den die dicke Innenwand

der Nachbarzelle infolge der Ausdehnung der dünnwandigen, die Atemhöhle begrenzenden Zellen ausübt; beim Verschuß geht das rundliche Lumen in ein mehr dreieckiges über, der Zug von innen läßt nach, es findet ein Annähern der beiden Schließzellen statt und die Bauchwände wölben sich vor, weil der Druck in der Schließzelle nachgelassen.

Erwähnenswert scheint mir noch die Tatsache zu sein, daß die Schließzellen des Blattes von *Paris quadrifolia* größer sind, als die angrenzenden Epidermiszellen, eine Erscheinung, von welcher mir noch kein anderes Beispiel bekannt ist.

So gibt es wohl bei weitem Untersuchungen noch mehr Modifikationen und Typen von Spaltöffnungen und wenn Benecke⁸⁾ meint, das Ideal einer Einteilung der Spaltöffnung wäre die, welche sich auf ihren Mechanismus beziehen würde, will ich dem nicht widersprechen. Aber es erhellt aus meinen Untersuchungen, daß dies nur auf Grund zahlreicher und eingehender Beobachtungen zu erreichen ist.

II. KAPITEL.

Anatomische Unterschiede der Spaltöffnungen am gleichen Organe und an verschiedenen Organen derselben Pflanze.

Im vorhergehenden Kapitel wurden Spaltöffnungstypen und ihre Modifikationen, wie sie in den verschiedenen Gattungen und Familien etc. vorkommen, behandelt; hier soll das Augenmerk auf die anatomischen Unterschiede der Stomata an ein und demselben Organe wie auch an Blatt und Stengel derselben Pflanze gerichtet werden.

Schon Haberlandt macht auf solche Unterschiede aufmerksam. Er sagt in dem Abschnitte über «Sonstige Beziehungen zwischen Bau und Funktion der Spaltöffnungen»⁹⁾: «So wie die Dicke der Epidermiszellen an verschiedenen Organen derselben Pflanze eine variable ist, ebenso werden voraussichtlich auch die geschilderten Schutzeinrichtungen des Spaltöffnungsapparates bald mehr, bald weniger ausgiebig fein.»

Hernach führt er zwei Beispiele an. Das erste bezieht sich auf die tiefere Einfenkung des Spaltöffnungsapparates auf der Blattoberseite von *Populus pyramidalis* gegenüber derjenigen der Blattunterseite, das zweite auf die größere, äußere Atemhöhle, welche die Schließzellen der Blattoberseite von *Plantago maior* gegenüber derjenigen auf der Blattunterseite bilden.

Ebenso erwähnt Westermaier in seinem Beitrage zur Festschrift für Schwendener «Über Spaltöffnungen und ihre Nebenapparate» (S. 75 ff.) zwei Fälle, in denen sich Unterschiede zwischen den Spaltöffnungsapparaten von Blatt und Stengel und zwar rückfichtlich ihrer Lage zur Epidermisaußenwand finden.

Im ersten Falle beobachtete er, daß bei der betreffenden *Orchis* die Stomata des Blütenchaftes etwas über das Niveau der Epidermisaußenwand erhaben sind, während sie beim Blatte im gleichen Niveau liegen; im zweiten Falle fand er, daß die Stomata des Stengels von *Maianthemum bifolium* bedeutend eingesenkt sind, während sie beim Blatte nur wenig unter dem Niveau der Epidermisaußenwand liegen.

Beide Tatsachen erklärt er durch die Festigkeitsverhältnisse der betreffenden Pflanze; es sollen die Schließzellen den Spannungen in der äußersten Organoberfläche entrückt werden.

Ähnliche und andere anatomische Unterschiede an Spaltöffnungen ein und derselben Pflanze fand auch ich im Verlaufe meiner Untersuchungen; ihre physiologische Bedeutung ist allerdings nicht immer leicht zu erklären.

Derartige anatomische Verschiedenheiten der Stomata können sich auf den Bau, die Mechanik, die Lage der Spaltöffnungen, wie auch auf deren Nebenzellen beziehen.

Unterschiede in Bezug auf Bau, Mechanik und Lage können vorkommen:

- a. zwischen den Stomata derselben Blattseite,
- b. zwischen den Stomata der Ober- und Unterseite desselben Blattes,
- c. zwischen den Stomata von Blatt und Stengel derselben Pflanze.

a. Verschiedenheiten zwischen den Stomata derselben Blattseite.

Bei *Helleborus foetidus*, *Pulmonaria montana*, *Oxalis acetosella* fand ich auf der nämlichen Blattseite neben dem echten *Helleborus*-Typus nicht selten auch dessen Modifikation, d. h. den Spaltenverschluß, bei welchem sich die äußern Hörnchen berühren. Im ersten Falle bleibt also beim Öffnen und Schließen des Apparates der Vorhof unbeweglich, während er im andern Falle eine Bewegung ausführen muß, wofern die Spaltöffnung funktionieren soll. Welche physiologische Bedeutung dieser Erscheinung zu Grunde liegt, bleibt unentschieden.

Einen weitem Unterschied im Spaltenverschluß auf ein und derselben Blattseite zeigen, wie oben schon ausführlich behandelt worden, die Stomata von *Primula elatior* und *officinalis* und von *Ranunculus acer*. Die beiden Primeln haben auf der Blattoberseite Spaltöffnungsapparate, die im spannungslosen Zustande einen Verschluß sowohl durch die Bauchwände als auch durch die äußern Hörnchen aufweisen; neben diesen kommen aber auch andere vor, deren Verschluß sich nur durch die äußern Hörnchen vollzieht. Ebenso zeigt auch *Ranunculus acer* auf der Blattunterseite diese beiden ebenerwähnten Formen von Spaltenverschluß.

b. Verschiedenheiten zwischen den Stomata der Blattober- und Blattunterseite.

Hierher gehören wiederum *Primula officinalis* und *elatior*. Bei beiden Pflanzen schließen sich, wie bereits gesagt, die Stomata der Blattunterseite nur durch das Zusammentreten der äußern Hörnchen, während von der Blattoberseite viele Stomata sowohl Hörnchen- als Centralspaltenverschluß zeigen.

Einen fernern Unterschied beobachtete ich zwischen den Spaltöffnungen der Ober- und Unterseite des Blattes von *Onobrychis fativa* (Fig. 20):



Fig. 20. Spaltöffnungen des Blattes von *Onobrychis fativa*, a. von der Unterseite, b. von der Oberseite.

Zunächst unterscheiden sich die Apparate hinsichtlich ihrer Größe, wie aus der Fig. 20 zu ersehen ist. Die Schließzellen sind nämlich auf der Blattunterseite in Bezug auf Höhen-, Breiten- und Längenausdehnung ansehnlicher als diejenigen der Blattoberseite. Im Querschnitte betrachtet, zeigen die Schließzellen der Blattoberseite infolge ihrer schiefen Lage etwelche Ähnlichkeit mit denjenigen von *Iris germanica*.

Sodann sind die Stomata der Blattunterseite kaum merklich eingesenkt, während diejenigen auf der oberen Seite ziemlich tiefer liegen.

Die physiologische Bedeutung dieser Unterschiede der Spaltöffnungen von *Primula* und *Onobrychis* scheint auf der Hand zu liegen. Es ist klar, daß die Blattunterseite der Gefahr allzustarker Verdunstung weniger ausgesetzt ist, als die Blattoberseite, zumal die Blätter von *Primula* nahe der Erde liegen. Deshalb haben die meisten Stomata auf der Oberseite des Blattes von *Primula* doppelten, auf der Unterseite dagegen nur einfachen Verschuß. In ähnlicher Weise ist die Blattoberseite von *Onobrychis fativa* gegen allzustarke Transpiration geschützt und zwar einerseits durch die feinere Öffnung der Mündungskanäle der Gase und anderseits durch ihre tiefere Einsenkung.

c. Verschiedenheiten zwischen den Stomata von Blatt und Stengel derselben Pflanze.

Interessanter gestalten sich die Verhältnisse, wenn man die Spaltöffnungsapparate des Blattes mit denen des Stammes oder der Ausläufer vergleicht.

Bei meinen Untersuchungen an *Mono-* und *Dicotyledonen* machte ich die Erfahrung, daß in der Regel die Schließzellen des Stengels, im Flächenschnitte betrachtet, länger, gestreckter, im Querschnitte höher und schmaler sind als diejenigen des Blattes. Infolge dieser Eigenschaften sind die Schließzellen des Stengels im allgemeinen zum Ausbiegen mehr geeignet als die kürzeren Schließzellen des Blattes. Ich glaube daher auch, daß die Einfenkung der Spaltöffnungen des Stengels in erster Linie auf mechanische Gründe zurückzuführen ist, doch ist auch Schutz gegen ein Übermaß der Transpiration keineswegs immer ausgeschlossen.

Durch die bedeutendere Höhenausdehnung der Schließzellen gewinnt der Luftkanal, welcher die innere Atemhöhle mit der Atmosphäre verbindet, an Länge, weshalb der Gasverkehr nicht mit der gleichen Leichtigkeit vor sich gehen wird, wie beim Blatt, wo diese Verbindungskanäle gewöhnlich sehr kurz sind. Diese Tatsache ist auch physiologisch verständlich. Denn das Blatt ist in erster Linie das assimilierende Organ und hat zugleich die Atmung zu besorgen, während der Stengel von der ersten dieser Funktionen weit weniger in Anspruch genommen wird, weshalb lebhafter und bequemer Gasverkehr im Blatt notwendiger ist als beim Stengel; aus diesem Grunde sind auch die Verbindungskanäle des Blattes kürzer und leichter passierbar.

Ebenso wird Assimilation die Urfache sein, weshalb das Blatt auf gleichem Flächenraume stets eine größere Anzahl Stomata besitzt als der Stengel.

Ein weiteres Merkmal, das die Spaltöffnungen des Stengels vor denen des Blattes auszeichnet, ist der Doppelverschluß durch Hörnchen und Centralpalte, während bei den Stomata des Blattes der gleichen Pflanze nur ein einfacher Verschluß stattfindet. Diese Tatsache ist wahrscheinlich wiederum dahin zu deuten, daß die Anforderungen an den Luftverkehr mit der Atmosphäre im Blatte größer sind, als im Stengel.

Ferner besitzt der Stengel in der Regel eine ziemlich dicke Epidermisaußenwand, weshalb wir hier oft fein ausgebildete äußere Gelenke finden, was bei den Spaltöffnungen des Blattes gewöhnlich nicht der Fall ist. Die Stomata des Stengels sind bald eingesenkt, bald über das Niveau der Epidermis erhaben, wie bereits gesagt, aus rein mechanischen Gründen. Das Blatt der gleichen Pflanze dagegen zeigt in den betreffenden Fällen keine Spur oder doch nur eine Andeutung von dieser Einrichtung. Endlich treffen wir aus gleichen Gründen im Stengel typische Nebenzellen, am Blatte aber sind sie, weil überflüssig, nicht vorhanden.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen wollen wir einige charakteristische Beispiele betrachten.

Smilacina bifolia zeigt am Blatte den *Tradescantia*-Typus (Fig. 2), wobei aber jedenfalls beim Öffnungsprozeß neben dem Höherwerden der Schließzellen auch Krümmung derselben infolge der Dehnung der Rückenwände eintritt, welche Bewegungen wir aus der Anatomie des Querschnittes erschließen können. Die Stomata liegen im Niveau der Epidermis. — Der Stengel besitzt ziemlich dicke Epidermisaußenwand. Um daher das Spiel der Schließzellen zu sichern, sind die Stomata eingesenkt, wie bereits durch Westermaier gezeigt wurde. Unter diesen Umständen ist als möglichst günstige Einrichtung ein zartes, äußeres Gelenk,

fenkrecht nach innen gebogen, zu betrachten, so daß die Schließzelle an der Epidermisaußenwand gleichsam aufgehängt wird (Fig. 21).



Fig. 21. Spaltöffnung von *Smilacina bifolia* (Stengel).

Kommen hierzu noch ausgesprochene, innere Gelenke, so ist ein solcher Spaltöffnungsapparat ganz ifoliiert, der Spannung der Stengeloberfläche und dem Biegungsdrucke entzogen, seine Funktion somit gesichert.

An eine Ausdehnung der Schließzellen bei eintretendem Turgor in der Richtung fenkrecht zur Oberfläche ist bei dieser Zellform, wie sie am Stengel vorkommt (Fig. 21), wohl nicht zu denken, sondern das Hauptmoment des Öffnungsmechanismus wird nach dem echten *Amaryllis*-Typus in der Dehnung der Rückenwand und in der dadurch bedingten Krümmung der Schließzellen bestehen.

So hätten wir bei dieser Pflanze eigentlich zwei Typen vertreten; im Blatte den *Tradescantia*- und im Stengel den echten *Amaryllis*-Typus.

Ähnlich gestalten sich die Verhältnisse bei *Cephalanthera pallens* (Fig. 22).




Fig. 22. Spaltöffnungen von *Cephalanthera pallens*, a. vom Blatt, b. vom Stengel.

Doch ist infolge der Niedrigkeit der Rückenwand bei den Schließzellen des Blattes im turgeszenten Zustande ein Ausbiegen derselben und somit eine Zunahme der Gesamtbreite des Apparates wenig bedeutend; die Hauptbewegung liegt vielmehr in der Höhengausdehnung der Schließzellen. Letztere befinden sich im Niveau der Epidermisaußenwand und besitzen keine äußern Gelenke, weil sie infolge der zarten Membranen der angrenzenden Zellen überflüssig wären. Im Gegenfatze dazu sind die Stomata des Stengels etwas eingefenkt und mit ausgesprochenen äußern und innern Gelenken versehen. Die Rückenwand ist von bedeutender Ausdehnung, so daß sie beim Öffnungsvorgange die Hauptbewegung auszuführen hat. Also zeigt sich auch hier wieder ein nicht geringer Unterschied zwischen dem Mechanismus der Spaltöffnungen des Blattes und des Stengels.

Auch bei *Vinca minor* liegen die Stomata des Blattes auf gleicher Höhe mit der Epidermisaußenwand

(Fig. 12), diejenigen des Stengels aber sind etwas vertieft, an innern und äußern Gelenken aufgehängt (Fig. 23) und dadurch dem Drucke der mächtigen Epidermiswandungen enthoben.




Fig. 23. Spaltöffnung von *Vinca minor* (Stengel).

Bei verschiedenen *dikotylen* Pflanzen kommt es vor, daß z. B. die Stomata des Blattes den echten *Hel-leborus*-Typus aufweisen, die des Stengels dagegen eine Modifikation deselben. So verhält es sich bei *Ane-mone nemorosa*, bei *Orobis vernus*, bei *Fragaria elatior*. Bei diesen Pflanzen berühren sich nämlich die Hörnchen der Spaltöffnungen des Blattes im geschlossenen Zustande nicht, wohl aber diejenigen der Spaltöffnungen des Stengels.

Ranunculus acer, *Primula elatior* und *officinalis* besitzen im Blatt, wie schon gezeigt, einen dem Schwimmpflanzentypus scheinbar ähnlichen Spaltöffnungsbau; total davon verschieden sind aber die Querschnittsformen der Stomata des Stengels und somit auch ihr Öffnungsmechanismus, wie oben dargelegt wurde. (Vergleiche die Figuren 16 b und 19.)

Hiemit sind die Unterschiede der Stomata zwischen

Blatt und Stengel noch nicht erschöpft, denn auch die Nebenzellen spielen diesbezüglich ihre Rolle.

Häufig kommt es vor, daß die Spaltöffnungen des Stengels von typischen Nebenzellen begrenzt werden, während die Stomata des Blattes derselben entbehren, so bei *Galium Mollugo*, *Asperula odorata*, *Mercurialis perennis*.

Unter Nebenzellen versteht man bekanntlich die den Schließzellen zunächstliegenden Zellen, welche sich vor den übrigen Epidermiszellen dadurch auszeichnen, daß sie in höherm oder geringerem Grade durch ihre Form von ihnen verschieden sind und in ihrer Gestalt von der eingefchlossenen Spaltöffnung sich mehr oder weniger abhängig zeigen. Damit ist angedeutet, daß es typische und weniger typische Fälle von Nebenzellen giebt. Vielleicht gelingt es mir, zur Kenntnis dieses viel bearbeiteten Gebietes einige Details hinzuzufügen.

Bald ist jede Schließzelle von je einer typischen Nebenzelle begrenzt, und dies trifft in der Großzahl der Fälle zu, bald liegen zwei bis drei hintereinander, wobei die dritte von der Form der Schließzelle nur mehr sehr wenig zeigt. Bei *Tradescantia alba* sind sowohl die Pole als auch die Rückwandseiten der Schließzellen




Fig. 24. Spaltöffnung von *Mercurialis perennis* (Stengel).

von typischen Nebenzellen begrenzt. Mitunter reihen sich nur an die eine Schließzelle typische Nebenzellen an; in einem solchen Falle fand ich gewöhnlich zwei hintereinander liegende, so bei *Mercurialis perennis* (Stengel) etc. (Fig. 24).

Es kommt auch vor, daß trotz dicker Epidermisaußenwand weniger typische Nebenzellen vorhanden sind, d. h. solche, die sich weniger der Form der Spaltöffnungen anpassen. In diesem Falle sind die Wände der Nachbarzellen bedeutend dünner, als die der übrigen Epidermiszellen, so bei *Viola filvatica* (Stengel) (Fig. 25).




Fig. 25. Spaltöffnung von *Viola filvatica* (Stengel).

Es können aber sowohl typische Nebenzellen als auch dünnwandige Nachbarzellen die Begleiter der Stomata an der nämlichen Pflanze sein. So sind die Spaltöffnungen am Stengel von *Vinca minor*, der bekanntlich eine mächtige Epidermisaußenwand besitzt, hie und da beiderseits, d. h. auf beiden Rückenwandseiten von zwei bis drei typischen Nebenzellen begleitet, öfter aber von einem Kranz von vier bis acht dünnwandigen, unter sich in der Richtung verschiedenen Nachbarzellen umgeben (Fig. 26 a und b). Aus dieser Tatsache geht hervor, daß diese dünnwandigen Nachbarzellen physiologisch gleichbedeutend sind mit typischen Nebenzellen.

Da gerade von den Nebenzellen die Rede ist, möchte ich noch beifügen, daß bekanntlich Solereder¹⁰⁾ bei der Einteilung der Spaltöffnungstypen besonderes Gewicht auf die Nebenzellen und ihre Verhältnisse gelegt hat und es wohl kaum einer Erwähnung bedarf, daß die im I. Kapitel aufgestellten mechanischen Spaltöffnungstypen mit den Solereder'schen keine nähern Beziehungen haben, da die Gesichtspunkte des genannten Autors sich von den oben meinerseits festgehaltenen wesentlich unterscheiden.




Fig. 26. a und b Spaltöffnungen von *Vinca minor* (Stengel).

Erwähnenswert ist auch, daß bei gewissen Pflanzen die Wellung oder Streifung der Cuticula, von außen

her gegen die Neben- oder Nachbarzellen hin verfolgt, allmählich abnimmt, bis sie auf diesen selbst gänzlich verschwunden ist, so bei *Mercurialis perennis*, *Viola filvatica* (Fig. 23 und 24), was jedenfalls zur Sicherung der Funktion der Spaltöffnung beitragen wird. Denn es ist wohl anzunehmen, daß die Wellung oder Streifung der Cuticula die Epidermis eines Blattes derber und widerstandsfähiger macht, und daß Stellen, wo diese Fältelung nicht vorhanden, weicher, nachgiebiger und geschmeidiger sind. Wenn also eine solche Streifung der Cuticula in der Nähe der Spaltöffnungen, eventuell auf deren Nebenzellen aufhört, so wird wohl der physiologische Grund hiefür in der Sicherung der Bewegungsvorgänge der Stomata zu suchen sein.

Die Spaltöffnungen am Stengel der soeben erwähnten Pflanzen *Mercurialis* und *Viola* besitzen stets ausgesprochene äußere Gelenke; wo aber bei den von mir untersuchten *Dicotylen* die äußern Gelenke fehlen, z. B. bei *Primula officinalis* und *elatior* (Stengel), *Ranunculus acer* (Stengel), *Mahonia aquifolium* (Blatt), da sind auch keine typischen Nebenzellen zu finden, welche Tatsache den Gedanken Westermayers, (Schwendeners Festschrift S. 67) zu bestätigen scheint.

Bei den Spaltöffnungen der Stengel der von mir untersuchten *Monocotyledonen* — *Gramineen* und *Cyperaceen* waren nicht Gegenstand meiner Untersuchungen — sind typische Nebenzellen zum Schutze der Funktion der Spaltöffnungsapparate nicht notwendig, denn die Epidermisaußenwand ist dünner und geschmeidiger als bei gewissen *Dicotylen*. Zudem haben in der Regel die Rückenwände der Schließzellen freien Spielraum für ihre Tätigkeit, weil keine Epidermiswände senkrecht auf die Rückenwände der Schließzellen stoßen, so bei *Smilacina bifolia* (Blatt und Stiel),

Platanthera bifolia (Blatt und Stiel), *Cephalanthera pallens* (Stiel), *Polygonatum multiflorum* (Blatt und Stiel), *Convallaria maialis* (Blatt) etc. — Doch gibt es von der letztern Erscheinung auch Ausnahmen. So treffen bei den Schließzellen des Blattes von *Cephalanthera pallens* die Radialwände der angrenzenden Epidermiszellen oft gerade senkrecht auf die Mitte der Rückenwände der Schließzellen, ebenso bei *Tamus communis*




Fig. 27. a Spaltöffnung von *Paris quadrifolia* (Stengel), b von *Convallaria maialis* (Blatt).

(Blatt und Beere). Es ist auch, wie bereits erwähnt, die Hauptbewegung der Schließzellen von *Cephalanthera pallens* (Blatt) beim Eintreten des Turgors nicht eine Ausbiegung der Rückenwand, sondern eine Ausdehnung in die Höhe, was mit der Lage der Schließzellen zu den betreffenden Epidermiszellwänden vollständig harmonisiert. Das Öffnen und Schließen ist also hier durch den Bau und den Mechanismus der Schließzellen selbst, nicht durch Nebenzellen gesichert.

Vergleichen wir endlich auf dem Flächenchnitte die Spaltöffnungen von *Paris quadrifolia* (Stengel) mit denen von *Convallaria maialis* (Blatt), so haben wir noch von einem andern Verhältnisse zu sprechen. Es ist, abgesehen von den Wandanfätzen der Epidermiszellen an die Schließzellen, die in beiden Fällen nicht sehr verschieden sind, immerhin noch eine Differenz zu erkennen. Der Spaltöffnungsapparat von *Paris quadrifolia* (Stengel) erscheint durch die am Rücken verlaufenden Epidermiswände viel mehr eingeeengt, weil die letztern längs der Spaltöffnung gerade Linien bilden, während bei *Convallaria maialis* dieses Verhältnis nicht vorhanden ist (Fig. 27 a und b).



III. KAPITEL.

Gefichtspunkte in Bezug auf die Verteilung der verschiedenen mechanischen Spalt- öffnungstypen.

In der Festschrift für Schwendener sagt Westermaier in der citierten Abhandlung: «Der *Helleborus*-Typus ist schon nach dem jetzigen Befund verschiedener Autoren bei den *Monocotylen* ziemlich verbreitet. Beispielsweise zeigt ihn ausgesprochen *Cypripedium infigne* (Blatt); auch das Blatt von *Tulipa* gehört hieher.»

Bei den von mir untersuchten *Monocotyledonen* fand ich den *Helleborus*-Typus, oder vielmehr dessen Modifikation, bei der *Dioscoree Tamus communis* und zwar am ausgesprochensten bei der Beere und beim Stengel, etwas weniger deutlich beim Blatt; doch immerhin ist auch hier die Form, Dimension und Lage der Verdickungsleisten eine solche, welche der Modifikation des *Helleborus*-Typus und nicht dem *Tradescantia*- oder *Amaryllis*-Typus entspricht (Fig. 28).




Fig. 28. Spaltöffnungen von *Tamus communis*: a vom Blatt, b vom Stengel und c von der Beere.

Während *Cypripedium insigne*, wie eben erwähnt, den *Helleborus*-Typus aufweist, zeigt *Cypripedium Calceolus* den *Tradescantia*-Typus.

Aus diesen und andern bekannten Erscheinungen geht hervor, daß nicht ein einziger Faktor, wie z. B. nur die Verwandtschaft oder nur die Form des Organs bestimmend auf den Spaltöffnungstypus einwirkt, sondern daß mehrere Gesichtspunkte in Betracht gezogen werden müssen, um die Verschiedenheiten der Spaltöffnungsmechanismen z. B. in der Abteilung der *Monocotylen*, wie auch in den einzelnen Familien derselben einigermaßen zu verstehen.

Um die Principien, welche bei der Verteilung der Spaltöffnungstypen unter den *Monocotylen* maßgebend sind, besser zu überblicken, stelle ich folgende Fragen:

1. Hat die Verwandtschaft einen Einfluß auf den Typus der Spaltöffnung?
2. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Form des Organs, z. B. der Blattform, und dem Typus der Spaltöffnung?
3. Gibt es einen Zusammenhang zwischen der Umrißform der Spaltöffnung, von der Fläche gesehen, und dem Typus?
4. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Lebensverhältnissen (Standort) und dem Typus?

1. Daß verwandte Pflanzen, ganze Familien, Spaltöffnungen aufweisen, welche in den wesentlichen Punkten übereinstimmen, ist bekannt; ich erinnere nur an die Familie der *Coniferen*, ferner der *Gramineen* und *Cyperaceen*. Die Familien der *Lilien*, *Orchideen*, *Asparageen* zeigen in der Regel den *Amaryllis*- oder *Tradescantia*-Typus. Doch finden wir bei den letztgenannten Familien Vertreter, deren Spaltöffnungen bald unwesentliche, bald wesentliche Verschiedenheiten vom

gemeinfamen Typus aufweisen; mit andern Worten, in der gleichen Familie können Modifikationen eines Typus oder 2—3 verschiedene Typen vorkommen.

In solchen Fällen wird der Einfluß der Verwandtschaft durch irgend einen andern Faktor gleichsam unterdrückt. Ein solcher Faktor, der bei verwandten Pflanzen Modifikationen eines Typus, oder gar wesentliche Abweichungen vom charakteristischen Typus der Familie mit sich zu bringen vermag, ist die Form des Organs (z. B. Blattform), das die Spaltöffnungen trägt. Damit kommen wir zur Beantwortung der zweiten Frage.

2. Hier handelt es sich also um die Blattform, speziell um das Verhältnis der Breite zur Länge, und es ist klar, daß im allgemeinen die Einwirkung der Blattform auf den Typus um so deutlicher vorhanden sein wird, je größer diese Formverschiedenheiten sich gestalten.

Vergleichen wir zunächst einige Pflanzen aus der Familie der *Asparageen*. Das Blatt von *Convallaria maialis* weist durchschnittlich ein Verhältnis der Breite zur Länge von 1:3 auf, und hier finden wir annähernd den *Amaryllis*-Typus (Fig. 29 a). *Polygonatum multi-*




Fig. 29. a Spaltöffnung von *Convallaria maialis* (Blatt). b Spaltöffnung von *Polygonatum multiflorum* (Blatt).

florum besitzt Blätter, die etwas kürzer, mitunter auch breiter sind, so daß Breite und Länge im Verhältnis von 1:2 stehen; hier sind nun die Verdickungsleisten der Schließzellen im Vergleich zu denjenigen bei den Schließzellen von *Convallaria maialis* von größerer Dimension, so daß der Typus nicht mehr dem *Amaryllis*-, wohl aber dem *Tradescantia*-Typus entspricht (Fig. 29 b).

Noch bedeutender ändert sich das Verhältnis der Breite zur Länge beim Blatt von *Smilacina bifolia*, so daß sich die Verhältniszahlen 2:3 ergeben; bei dieser Spaltöffnung treffen wir den ausgesprochenen *Tradescantia*-Typus (siehe Fig. 2).

Ziehen wir ferner einen Vergleich zwischen zwei Vertretern aus der Familie der *Dioscoreaceen*. *Smilax mauritanica* zeigt ungefähr eine gleiche Blattform wie *Smilacina bifolia*, nämlich das Verhältnis der Breite zur Länge 2:3, und dieses Blatt besitzt in seinen Spaltöffnungen den *Tradescantia*-Typus (Fig. 30).



† Fig. 30. Spaltöffnung von *Smilax mauritanica* (nach Herbarmaterial).

Vergleichen wir damit eine andere *Dioscoree* nämlich *Tamus communis*, die in ihrer ganzen äußern Erscheinung den *Monocotylen*-Charakter nicht verrät und vor allem nicht in den Blättern. Denn das herzförmige Blatt ist in der Regel so breit wie lang; Breite und Länge verhalten sich also wie 1:1. Hier entsprechen nun auch die Formen der Verdickungsleisten dem Schwendenerfchen *Helleborus*-Typus (siehe Fig. 28 a). Während man also rücksichtlich der Verwandtschaft den *Amaryllis*- oder *Tradescantia*-Typus

erwartet, zeigt diese Spaltöffnung den *Helleborus*-Typus und zwar ist es die Form des Blattes, welche diesen Typus verlangt. Denn der Standort und die Form der Spaltöffnung selbst, von der Fläche gesehen, stimmt ungefähr mit den Verhältnissen und Apparaten oben besprochener Pflanzen überein; jedenfalls wäre der Unterschied nicht so gewaltig, daß er einen andern Spaltöffnungstypus zu bedingen vermöchte. Hingegen weicht die Form des Blattes von *Tamus communis* so bedeutend von der charakteristischen Form der *Monocotylen* ab, daß es nahe liegt, die Ursache für einen andern Spaltöffnungstypus gerade hierin zu erblicken.

Von den beiden *Orchideen* *Platanthera bifolia* und *Cephalanthera pallens* besitzt die erstere schmale, die letztere breitere Blätter, so daß das Verhältnis der Breite zur Länge bei der erstern durch 1:3, bei der letztern durch 2:3 ausgedrückt werden kann. *Platanthera bifolia* zeigt nun in den Spaltöffnungen des Blattes Verdickungsleisten von sehr geringer Dimension, wie sie sonst nur dem reinen *Amaryllis*-Typus zukommen. Und auf den ersten Blick möchte man glauben, daß diese Schließzellen der Form des echten *Amaryllis*-Typus entsprechen, doch bei genauerer Betrachtung findet man, daß infolge der niedrigen Rückenwände der Öffnungsmechanismus nach dem *Tradescantia*-Typus vor sich geht (Fig. 31).



Fig. 31. Spaltöffnung von *Platanthera bifolia* (Blatt).

Ein Querschnitt durch eine Spaltöffnung von *Cephalanthera pallens* (Blatt) erinnert an den *Helleborus*-Typus (Fig. 22 a), besonders entspricht die innere Ver-

dickungsleiste diesem Typus und unterscheidet sich bedeutend von derjenigen der Stomata von *Platanthera bifolia*. Können wir diesen Spaltöffnungsapparat auch nicht gerade dem echten *Helleborus*-Typus zuschreiben, so nähert er sich doch diesem sehr, er steht gleichsam in der Mitte zwischen *Helleborus*- und *Tradescantia*-Typus. Daß hier wirklich die Form des Blattes ihren Einfluß ausübt, geht unter anderm auch daraus hervor, daß z. B. die Spaltöffnung des Stengels wieder den *Tradescantia*-Typus zeigt.

Diese Beispiele beweisen, daß bei den *Monocotylen* zwischen der Blattform und dem Typus der Spaltöffnung wirklich Beziehungen bestehen, die mitunter von solchem Einflusse sein können, daß die Formen der Verdickungsleisten oder auch die Dimensionen der dünnwandigen Stellen der Schließzellen und damit der Öffnungsmechanismus innerhalb der gleichen Familie, ja sogar an der gleichen Pflanze gewisse Differenzen aufweisen.

3. Besteht, um zur dritten Frage zu kommen, auch zwischen der Umrissform der Spaltöffnung, auf den Flächenschnitt bezogen, und dem Typus ein innerer Zusammenhang, eine Wechselbeziehung, und inwiefern? Der Gedanke ist nicht neu; schon Westermaier hat ihn berührt, indem er in seiner Schrift «Über Spaltöffnungen und ihre Nebenzellen» (S. 67) sagt: «Im Hinblick auf den letztern Fall drängt sich nebenbei der Gedanke auf, daß nicht einzig bloß bei den *Gramineen*, sondern auch in andern Fällen die Flächenansicht einen gewissen Anhaltspunkt darüber geben kann, welchem mechanischen Typus das betreffende Stoma angehört. Die ungefähr kreisrunde Flächenansicht im geschlossenen Zustande läßt nämlich von vornherein die Annahme einer wesentlich stärkeren Wölbung der Rücken-

wand, nach Art des *Liliaceen*-Typus, beim Öffnungsvorgang nicht als wahrscheinlich erscheinen und weist mehr auf eine Querschnittsveränderung des Lumens hin.»

Auch ich gab mir auf obige Frage zum Vorn herein eine bejahende Antwort. Denn die Gesetze der Mechanik scheinen es durchaus zu verlangen, daß langgestreckte Schließzellen leicht die Rückenwand ausbiegen können, den *Gramineentypus* ausgenommen, daß man also bei solchen Schließzellen die Verdickungsleisten nach dem *Amaryllis*-Typus finden möchte; eine isodiametrische Form des ganzen Spaltöffnungsapparates aber, wobei die Schließzellen bereits schon eine bedeutende Krümmung besitzen, scheint nicht dazu bestimmt zu sein, sich noch mehr auszubiegen, sondern hier wird beim Öffnen in erster Linie eine Querschnittslumenveränderung, z. B. nach dem *Helleborus*-Typus, vor sich gehen. Mit andern Worten, im allgemeinen möchte man bei langgestreckten Spaltöffnungsapparaten mehr den *Amaryllis*-, bei isodiametrischen den *Tradescantia*- oder *Helleborus*-Typus finden.]

Diese Vermutung hat sich aber bei [meinen Untersuchungen nicht durchgehends bestätigt. Denn ich fand auf Flächenschnitten isodiametrische Stomata, welche bei der [einen Pflanze] den [Amaryllis]-, bei [einer andern] den [Helleborus]-Typus zeigten; [so hat *Convallaria maialis* (Blatt) ziemlich isodiametrische] Spaltöffnungsapparate [und [der Querschnitt gibt das Bild vom *Amaryllis*-Typus (Fig. 29a), während bei der Beere von *Tamus communis*, die [ebenfalls fast kreisrunde Stomata trägt, der *Helleborus*-Typus vertreten ist (Fig. 28 c). Anderseits gibt es aber viele langgestreckte Schließzellapparate, welche den *Helleborus*-Typus oder dessen Modifikation zeigen, so bei *Tamus communis* (Stengel), bei *Galium Mollugo* (Blatt und Stengel), bei *Anemone*

nemorosa (Blatt und Stengel), bei *Mercurialis perennis* (Blatt und Stengel), bei *Aquilegia vulgaris* (Stengel), *Orobis vernus* (Stengel) etc., hingegen finden wir bei den gestreckten Stomata von *Smilacina bifolia* (Stengel) wieder den *Amaryllis*-Typus.

Trotz dieser Tatsachen kann ich mich inzwischen nicht von dem Gedanken losfagen, daß zwischen der Form der Spaltöffnung in der Flächenausdehnung und dem Typus mitunter ein enger Zusammenhang bestehe. Ein Beweis dafür ist mir freilich gegenwärtig noch nicht möglich, da hiezu genaue Messungen in Bezug auf die Veränderungen der Breite und Höhe der Schließzellen das entsprechende Material liefern müssen.

4. Die Verwandtschaft, die Organform und die Umrißform der Spaltöffnung sind nun aber noch nicht alle Gesichtspunkte, die wir ins Auge fassen müssen, um die Verteilung der Spaltöffnungstypen in der Abteilung der *Monocotylen* einigermaßen zu verstehen; denn auch der Standort, überhaupt die Lebensverhältnisse einer Pflanze haben ihre Einwirkung auf den Typus.

Bei dem langen schmalen Blatte von *Cypripedium insigne* finden wir wider alle Erwartung den ausgesprochenen *Helleborus*-Typus. Sowohl aus der Verwandtschaft als auch aus der Blattform würden wir zum voraus etwa den *Tradescantia*- oder den *Amaryllis*-Typus erwarten. Keines von beiden wirkt also entscheidend auf den Typus ein; es muß somit eine andere Ursache vorhanden sein, welche das Strukturverhältnis beherrscht. Diese ist nirgend anders zu suchen als in den Lebensverhältnissen der Pflanze, welche für das Öffnen und Schließen der Stomata den geeignetsten Mechanismus erfordern, und der ist in diesem Falle der *Helleborus*-Typus. Dieser Typus ist es nämlich, welcher nach meinen Untersuchungen beim Nachlassen des Turgors

sich schneller schließt als z. B. der *Amaryllis*- oder *Tradescantia*-Typus. Ich brachte nämlich frische Blätter von *Helleborus foetidus*, von *Paris quadrifolia* und von *Aspidium Filix mas* in Dunkelheit, und da waren es die Stomata von *Helleborus foetidus*, welche sich zuerst schlossen. Ferner dürfen wir annehmen, daß der *Helleborus*-Typus weniger Kraft zum Öffnen brauche als der *Amaryllis*-Typus, denn die Dehnung und zugleich die Krümmung der Schließzellen des letztern werden in ihrem Innern einen größern Druck erfordern als eine bloße Veränderung des Lumenquerschnittes und eine Scharnierbewegung, welche Veränderungen beim Öffnen und Schließen nach dem *Helleborus*-Typus die Hauptfache bilden. Wenn wir nun bedenken, daß *Cypripedium insigne* nach zuverlässigen Angaben eine Pflanze ist, deren Standort und Lebensbedingungen Schutz gegen allzustarke Verdunstung verlangen, so begreifen wir dieses Abweichen im Spaltöffnungstypus gegenüber andern Gliedern der betreffenden Familie. Denn *Cypripedium Calceolus* verhält sich in dieser Beziehung ganz anders; es besitzt wie viele *Monocotylen* den *Amaryllis*-Typus. Die Verschiedenheit des Standortes dieser Pflanze — in der Regel unsere schattigen Wälder — beherrscht hier, so schließen wir, die Bauverhältnisse, trotz der systematischen Verwandtschaft und obwohl die Blattform von *Cypripedium Calceolus* sogar zu größerm Breitendurchmesser hinneigt gegenüber *Cypripedium insigne*.

Iris Psudacorus zeigt nach Westermaier den *Amaryllis*-Typus, hingegen *Iris germanica* nach Schellenberg einen davon gänzlich verschiedenen, eigenartigen Typus (Fig. 8).

Diese beiden verwandten Pflanzen unterscheiden sich keineswegs in der Blattform, wohl aber wiederum

in Bezug auf ihren Standort. Bekanntlich ist *Iris Pseudacorus* eine wasserliebende Pflanze, die nur an feuchtem Standorte gedeiht, während *Iris germanica* mehr auf trockenem Boden vorkommt. Und ich glaube, daß auch hier wiederum die Regulatoren des Gaswechsels und der Transpiration bei Gliedern der gleichen Familie verschiedene Formen besitzen, weil sie zum Standorte in Wechselbeziehung stehen.

Es findet also bei den *Monocotylen* nicht nur ein Zusammenhang zwischen Verwandtschaft und Typus, ferner zwischen Organform, wie auch zwischen Umrißform der Spaltöffnung (auf die Flächenansicht bezogen) und Typus, sondern auch ein solcher zwischen den Lebensverhältnissen und dem Bau-Typus, beziehungsweise Mechanismus der Spaltöffnung statt. Doch wird in der Großzahl der Fälle der Typus der Stomata von der Verwandtschaft abhängig fein und nur in jenen Fällen, wo die Pflanze Organformen aufweist, die von den sonst charakteristischen Dimensionen einer Familie stark abweichen, oder wenn Lebensverhältnisse vorliegen, die von einander sehr verschieden sind, wird der Einfluß der Verwandtschaft auf den Typus der Spaltöffnung von demjenigen der erwähnten Verhältnisse überwogen.

Welche Gesetze hinsichtlich der Verteilung der Spaltöffnungstypen bei den *Dicotylen* sich geltend machen, muß einer spätern Untersuchung vorbehalten werden; wie es scheint, gestalten sich die Verhältnisse hier noch viel komplizierter.

Bei der Abteilung der Farne treffen wir ebenfalls verschiedenartige Bauformen der Stomata. *Aspidium Filix mas* zeigt Spaltöffnungen nach dem *Tradescantia*-Typus, wo die Hauptbewegung beim Öffnungsmechanismus in der Höhenausdehnung der Schließzellen

besteht; *Oleandra neriifolia* besitzt Stomata, die im Bau und Mechanismus mit den vorhergehenden etwelche Ähnlichkeit zeigen, wie früher schon dargelegt worden. (Vergleiche Fig. 15 b). Bei *Dipteris conjugata* Reinw. sind die Spaltöffnungsapparate eingefenkt; die Dimensionen und Anordnung der Verdickungsleisten lassen erkennen, daß der Öffnungsmechanismus sich von dem, der eben erwähnten Stomata unterscheidet, denn hier wird sich die Rückenwand der Schließzellen zur Zeit des erhöhten Turgors nicht unbedeutend ausdehnen.

Die Standortsangaben von *Oleandra neriifolia* und *Dipteris conjugata* nach Raciborski¹¹⁾ lassen mitunter starke Infolation wirksam sein; außerdem erhellt aus der Anatomie der Stomata, daß dies bei *Dipteris* in höherm Grade der Fall ist.

Wenn wir endlich noch die Spaltöffnungen der Farngattung *Niphobolus* heranziehen, wie sie uns von Giefenhagen¹²⁾ dargestellt wurden, so finden wir auch hier wiederum eine große Mannigfaltigkeit der Bauverhältnisse und der Lage der Stomata. Vermutlich liegt bei *Niphobolus Bonii*, *N. spissus*, *N. confluens* ein ähnlicher Typus vor wie bei *Oleandra neriifolia*, doch fehlen bei letzterer Pflanze die Nebenzellen. Wie es scheint, hat aber Giefenhagen speziell auf die Dimensionen und Formen der Verdickungsleisten bei den Spaltöffnungen der verschiedenen Spezies von *Niphobolus* nicht besonderes Gewicht gelegt. Um bei den Farnen die leitenden Gesichtspunkte, nach denen die Spaltöffnungstypen verteilt sind, einigermaßen herauszufinden, müßte natürlich die Anzahl der Untersuchungsobjekte bedeutend vermehrt werden, was mir jetzt nicht möglich ist.

IV. KAPITEL.

Spaltöffnungen an unterirdischen Organen.

Anatomisch-physiologische Arbeiten über Spaltöffnungen unterirdischer Organe wurden, meines Wissens, bisher verhältnismäßig wenige veröffentlicht.

Die mir bekannten Abhandlungen sind mehr beschreibender Natur und befaßen sich nicht näher mit der Funktion dieser dem Lichte entzogenen Stomata. So bespricht A. Guillaud¹³⁾ im Jahre 1878 in feinen Thèses etc. ganz kurz das Aussehen der Flächenansicht von den Spaltöffnungen des Rhizoms von *Polygonatum multiflorum* und von *Conrallaria maialis*; im Jahre 1880 erschien von R. Hohnfeldt¹⁴⁾ als Inaug.-Dissertation in Königsberg eine Arbeit «Über das Vorkommen und die Verteilung der Spaltöffnungen auf unterirdischen Pflanzenteilen», worin er erwähnt, daß er 71 Pflanzenarten untersucht und nur wenige Rhizome gefunden habe, welche gänzlich der Stomata entbehren. Auch J. Costantin¹⁵⁾ kommt auf die Arbeit Hohnfeldts zu sprechen und führt als die hauptsächlichsten Resultate derselben folgende an:

«1. Il y a plus de stomates en general sur les tiges aériennes, que sur les tiges souterraines; les stomates peuvent même manquer sur ces dernières (*Asarum europaeum*, *Senecio saracenicus*, *Campanula glomerata* etc.)

2. Il y a des stomates sur les bractées écailleuses souterraines, mais, en general, moins à surface égale que sur les feuilles aériennes.

3. Il y a souvent plus de stomates à la face supérieure qu' à la face inférieure des écailles souterraines.»

Im Jahre 1890 erschien in Halle-Wittenberg eine Inaug.-Dissertation von L. Heydrich¹⁶⁾ «Beiträge zur vergleichenden Anatomie einiger Zwiebelgewächse», worin auch die unterirdischen Stomata kurz berührt werden, doch berücksichtigt der Verfasser nach Jufts Jahresbericht nur die Flächenansicht derselben und beschränkt sich auf die Mitteilung, daß sie, «wenig länger als breit, mitunter sogar breiter als lang sind.»

Meine Untersuchungen beziehen sich auf die Anatomie und zum Teil auch auf die Funktion der unterirdischen Spaltöffnungen. Vorab befaßte ich mich mit dem Studium der Stomata an den Rhizomen von *Polygonatum multiflorum* und von *Convallaria maialis*.

Der Wurzelstock von *Polygonatum multiflorum* hat zahlreiche Spaltöffnungen. Sie sind ringsum ziemlich gleichmäßig verteilt, so daß sich in dieser Hinsicht zwischen der der Erdoberfläche zugekehrten und der entgegengesetzten Seite kein Unterschied zeigt.

Anfangs Mai fand ich bei jedem frisch ausgegrabenen Rhizom eine nicht geringe Anzahl offener Apparate, anfangs Juli hingegen waren jedesmal nur noch wenige offene wahrzunehmen. Neben diesen funktions-tüchtigen bemerkte ich aber auch funktionslose Stomata.

Die anatomischen Untersuchungen der beiden Arten von Spaltöffnungsapparaten ergaben folgende Resultate.

I. Die funktionierenden Stomata, d. h. jene, welche in einem entsprechenden Abschnitte der Vegetationsperiode als Verkehrsstellen des Gasaustausches dienen, sind von der Fläche gesehen in der Regel isodiametrisch, im geöffneten Zustande oft bedeutend breiter

als lang (Breite zur Länge wie 3:2). Da auf dem Flächenfchnitte die Cuticularleiste zugleich mit der Verdickungsleiste stark hervortritt, nimmt sich das Bild etwas anders aus als ein Spaltöffnungsapparat des Blattes, unter anderm auch deswegen, weil die Schließzellen chlorophyllfrei, dafür aber mit feinen Stärkekörnern angefüllt sind. Die offene Centralpalte erscheint gewöhnlich als eine kleine Ellipse. Typische




Fig. 32. Spaltöffnung des Rhizoms von *Polygonatum multiflorum* a Flächenansicht (offen), 1—1 Rückenwände, 2—2 Wandanfätze, 3—3 Cuticula samt Verdickungsleisten, 4—4 äußere Hörnchenpalte, 5 offene Centralpalte, b Querschnitt.

Nebenzellen sind nicht vorhanden; wohl aber werden die Schließzellen von 4—6 Nachbarzellen umgeben, deren Radialwände dünner sind als die übrigen Epidermiszellen (Fig. 32 a). Auf dem Querschnitte (Fig. 32 b) fallen uns die starkentwickelten Verdickungsleisten auf, welche ein streitaxähnliches Lumen begrenzen; die dünne Stelle auf der Bauchwandseite ist sehr schmal; die Rückenwände sind von ansehnlicher Ausdehnung. Die Cuticularsubstanz zieht sich bis zu den innern Hörnchen hinein. In vielen Fällen trifft man eine geräumige, innere Atemhöhle.

II. Von diesen funktionierenden Stomata unterscheiden sich deutlich die funktionslosen, d. h. jene, welche früher funktioniert haben, jetzt aber aus verschiedenen Gründen für immer verschlossen bleiben. Auf dem Flächenchnitte erkennt man sie leicht an ihrer gelblichen Farbe, die von der Cuticularsubstanz herrührt, welche die ganze, zwischen den Schließzellen liegende Spalte ausfüllt. Wie aus den Querschnittfiguren zu ersehen ist, gibt es verschiedene Arten von funktionslosen Spaltöffnungen.

a. Fig. 33 zeigt uns einen außer Tätigkeit gesetzten Apparat, bei dem die Schließzellen vom Rücken her zusammengedrückt und zusammenge schrumpft sind, und deren Lumen infolge dessen sehr verengert und deformiert ist. Vorhof und Centralspalte sind mit lockerer, wenig kompakter Cuticularsubstanz ausgefüllt. Die Substanz der Verdickungsleisten erscheint schwach gelblich. Die Atemhöhle ist durch eingewachsene Zellen auf ein Minimum beschränkt.

b. In Fig. 34 sehen wir eine andere Art funktionsloser Stomata. Die Schließzellen sind nicht deformiert, hingegen sind die Verdickungsleisten sehr dick und mächtig entwickelt, so daß das Lumen schmal und

klein wird. Die Atemhöhle ist total verschwunden; denn die innern Hörnchen sind mit der Membran der



Fig. 33. Funktionslose Spaltöffnung am Rhizom von *Polygonatum multiflorum*.

zunächstliegenden Zelle verwachsen. Diese Art funktionsuntüchtiger Spaltöffnungen treffen wir am häufigsten.



Fig. 34. Funktionslose Spaltöffnung am Rhizom von *Polygonatum multiflorum*.

c. In Fig. 35 finden wir endlich noch eine dritte Art funktionsloser Stomata. Nebst der Verstopfung des Vor- und Hinterhofes und der Centralspalte zeigt sich ein eigentümlicher Verschluß von innen. Es lagert

sich nämlich hart an die Schließzellen, tropfenartig, eine Kerngummi ähnliche Substanz, welche jede Kommunikation von außen mit der noch vorhandenen, innern Atemhöhle vollständig unterbricht.



Fig. 35. Funktionslose Spaltöffnungen am Rhizom von *Polygonatum multiflorum*.

Solche außer Tätigkeit gesetzte Spaltöffnungen finden sich am häufigsten an ältern Teilen eines Rhizoms, doch kommen neben diesen immer noch funktionierende vor.

Behandelt man den Flächenschnitt von einem ältern Rhizom mit Phloroglucin und Salzsäure, so zeigen die Schließzellen der funktionslosen Stomata gewöhnlich die Verholungsreaktion und häufig ebenso die Nachbarzellen, die rings um die Spaltöffnung gelagert sind.

Zwischen diesen beiden Arten von Stomata, den funktionstüchtigen und den funktionslosen, gibt es noch eine dritte Art, ich möchte sie ruhende nennen. Als ich nämlich Ende Juli und Anfangs August die Rhizome von *Polygonatum multiflorum* untersuchte, fand ich, wie bereits erwähnt, immer nur eine sehr kleine Zahl offener Stomata, mit denen ich experimentieren konnte; weitaus die Großzahl zeigte keine Empfindlichkeit für Wasserzufatz. Da man sich nun nicht leicht denken kann, daß auch im Frühjahr wäh-

rend des Saftsteigens die gleiche geringe Zahl von Stomata tätig sei, da ferner diese Stomata vollständig mit den funktionierenden übereinstimmen und ihre Schließzellen in gleicher Weise mit Stärkekörnern gefüllt sind, wird man wohl annehmen dürfen, daß sie nach der Fruchtreife ihre Tätigkeit einstellen, um sie im Frühjahr aufs neue zu beginnen.

Wie am Rhizom von *Polygonatum multiflorum*, so gibt es auch an demjenigen von *Convallaria maialis* funktionierende und funktionslose Spaltöffnungen. Die letztern finden sich wiederum hauptsächlich an ältern Partien des Rhizoms, welche gewöhnlich die direkte Fortsetzung des oberirdischen Stengels bilden, wo zugleich auch die Niederblätter fehlen, während die tätigen Stomata besonders auf jüngern horizontalen Ausläufern unter den Niederblättern zu finden sind. Die Spaltöffnung ist hier eingesenkt, während sie am Rhizom von *Polygonatum* etwas über das Niveau der Epidermis erhaben ist. Man ist geneigt, anzunehmen, daß die Erhöhung über die Epidermis deshalb vorhanden ist, damit das durch den Boden sickende Regenwasser günstig über die Stomata abfließen kann, ohne die Cuticular- und Centralspalte mit Erdteilchen zu verschließen. Diese Anordnung würde also nebst den großen äußern Hörnchen einen Schutz gegen Verstopfung der Spalte bieten. Die vertiefte Spaltöffnung beim jungen Rhizom der *Convallaria* ist durch zarte, ringsum einhüllende Niederblätter vor Verstopfung geschützt. Damit aber dennoch eine ausgiebige Atmung stattfinden kann, sind die Stomata eingesenkt und es ist so ein Hohlraum zum leichtern Gasaustausch geschaffen.

Die tätigen Spaltöffnungen der Rhizome von *Convallaria maialis* (Fig. 36 a) und *Polygonatum mul-*

tiflorum stimmen im Flächenfchnitte in Bezug auf die Form (Breite zur Länge 4:3) mit einander überein,




Fig. 36. a. Spaltöffnung des Rhizoms von *Convallaria maialis*, Flächenfchnitt; 1—1 Rückenwände, 2—2 Wandanlässe, 3—3 äußere Hörnchenpalte, 4 Centralpalte (offen).

doch sind die Stomata von *Convallaria* bedeutend größer, aber an Zahl geringer. Einen wesentlichen Unterschied hingegen weist der Querschnitt der beiden angeführten Stomata auf. Die Verdickungsleisten von *Convallaria* sind nämlich gering und entsprechen dem echten *Liliaceen*-Typus, wie er an Blatt und Stengel



Fig. 36. b. Spaltöffnung des Rhizoms von *Convallaria maialis*, Querschnitt, derselben Pflanze vorkommt (Fig. 36 b). Die Cuticula ist geschichtet und zieht sich bis in die innere Atem-

höhle hinein. Die rundlichen Lumina der Schließzellen sind ebenfalls mit Stärkekörnern angefüllt, die aber größer und zahlreicher sind als jene von *Polygonatum*.

Von den funktionsfähigen Spaltöffnungen heben sich wiederum schon auf Flächenschnitten die funktionslosen deutlich ab, sie sind bedeutend breiter als lang; ferner haben Cuticular- und Centralpalte nicht die




Fig. 37. a. Funktionslose Spaltöffnungen von *Convallaria maialis* (Flächenschnitt); 1-1 Wandanätze, 2-2 Bauchwände, 3 Rinne oder Einfenkung in der Cuticularsubstanz, 4-4 Verwachsungsmembranen der Schließzellen (punktierte Linien), b. Funktionslose Spaltöffnung von *Polygonatum multiflorum*.

Richtung der Längsachse der Spaltöffnung, sondern nehmen eine senkrechte Lage dazu ein. Während diese interessante Form bei den funktionslosen Stomata von *Convallaria* (Fig. 37 a) typisch ist, treffen wir bei *Polygonatum* nur in seltenen Fällen auf eine Spaltöffnung, welche diese Querorientierung der Centralpalte einigermassen an sich trägt (Fig. 37 b).

Fig. 38 zeigt uns den Querschnitt durch einen funktionslosen Spaltöffnungsapparat. Die Cuticularsubstanz der beiden Schließzellen ist verwachsen und füllt Vor- und Hinterhof, wie auch die Centralpalte, vollständig aus. Die Bauchwände der Schließzellen zeigen keine dünnen Stellen mehr, sondern sind von den äußern bis zu den innern Hörnchen von gleicher und bedeutender Mächtigkeit.



Fig. 38. Funktionslose Spaltöffnung von *Convallaria maialis* (Querschnitt).

Sichtlich beziehen sich die Worte Guillauds [S. 58¹³] auf solche außer Tätigkeit stehende Stomata, da er schreibt: «On y trouve des stomates globuleux réduits à leurs deux cellules de bordure et placés en travers au milieu d'une longue cellule ordinaire d'épiderme. L'ouverture du stomate est ainsi traversale,

ce qui n'est pas le cas ordinaire dans les stomates des rhizomes.»

Über die von mir berührten Verhältnisse, speziell über den Unterschied zwischen funktionsfähigen und funktionslosen Apparaten, ist aus dieser Bemerkung nichts zu entnehmen. Denn die tätigen Stomata sind, wie wir sehen, normal gebaute Apparate, bei denen Anatomie und Mechanik vollständig dem echten *Amaryllis*-Typus entsprechen. Diese kommen in weit größerer Zahl vor als die funktionslosen (ihre Anzahl verhält sich wie 10:2), und sie sind in erster Linie an den horizontal abzweigenden Rhizomteilen, welche sich durch weißliche Farbe auszeichnen, zu finden; an älteren Teilen des Wurzeltrockes, die von gelblicher Farbe sind, treffen wir zunächst Übergangsformen und endlich jene abnormalen, funktionslosen Spaltöffnungen.

Nach diesen anatomischen Darlegungen erübrigt mir noch etwas von der physiologischen Bedeutung und besonders von der Ursache des Öffnens und Schließens dieser unterirdischen Stomata zu sagen.

Bekanntlich sind die Spaltöffnungen der oberirdischen Organe einerseits Verkehrsstellen der zur Assimilation und Atmung notwendigen Gase, anderseits Regulatoren der Transpiration. Die Tätigkeit der Spaltöffnungen an unterirdischen Organen wird nur teilweise die gleiche sein. Zunächst wird es sich um die Atmung handeln. Wie es sich dagegen mit der Regulierung der Transpiration und mit der Aufnahme von Kohlenäure für die Assimilation der oberirdischen Organe verhält, ist schwer zu sagen. Doch ist letztere Funktion nicht unwahrscheinlich; denn bei dem matten Lichte im Schatten des Buchenwaldes könnte eine Vermehrung der Zufuhr der Kohlenäure durch die unterirdischen Stomata gewiß von Vorteil sein.

Mag nun auch die phyfiologische Bedeutung der unterirdifchen Stomata zum Teil die gleiche fein wie diejenige der oberirdifchen, fo ift jedenfalls ficher, daß das eigentliche Agens des Öffnens und Schließens des Apparates ein anderes ift; denn Schwendener [S. 6⁴] hat beftätigt, was Mohl [S. 6¹] fchon gefunden hatte, daß die Spaltöffnungen grüner Organe im Sonnenlichte, d. h. bei dem durch Affimilation geftiegerten Turgor fich öffnen, und er hat zugleich auch nachgewiefen, daß Dunkelheit, beziehungsweife der finkende Turgor, fie fchließt; Schellenberg [S. 13⁵] wiederholte die Verfuche und widerlegte die diesbezüglichen Einwände von Leitgeb. Bei den Schließzellen an den unterirdifchen Wurzeltöcken von *Polygonatum* und *Convallaria*, überhaupt aller im Dunkel des Bodens verborgenen Stomata, kann es fich nicht um eine Affimilationstätigkeit handeln, da jedes Chlorophyll fehlt und die Apparate vollftändig dem Lichte entzogen find.

Um den phyfiologischen Urfachen des Öffnens und Schließens diefer Spaltöffnungen auf die Spur zu kommen, machte ich folgende Verfuche.

Ich behandelte Flächenfchnitte, welche ich im Mai an unmittelbar aus der Erde gegrabenen Rhizomen machte, mit verdünntem Glycerin, worauf fie fich fchloffen. Sogleich nach dem Verfluß goß ich wieder Waffer hinzu, die Plasmolyfe in den Schließzellen hob fich fehr rafch und die Centralfpalte öffnete fich wieder. Diefes Spiel des Öffnens und Schließens habe ich bei jedem Präparat drei- bis viermal wiederholt und machte dabei viele Meffungen, von denen ich zum beffern Verftändniffe der Bewegungsvorgänge einige anführen will. Die nachftehenden Meffungen wurden auf Flächenfchnitten an Spaltöffnungen von *Polygonatum* gemacht.

		Offen im Wasser.	Nach Zusatz v. Glycerin.	Zum 2. Mal im Wasser.
I.	Gesamtbreite der Spaltöffnung:	29	25	29
	Breite der Centralpalte:	3	0	3
II.	Gesamtbreite der Spaltöffnung:	28 $\frac{1}{2}$	25	29
	Breite der Centralpalte:	1	0	2
III.	Gesamtbreite der Spaltöffnung:	31	27	31
	Breite der Centralpalte:	2	0	2

Wie man aus diesen Angaben ersehen kann, machen die Rückenwände bei Wasserentzug, beziehungsweise bei Wasserzufuhr, stets eine ansehnliche Bewegung, während diejenige der Centralpalte immer etwas kleiner ist; der Unterschied schwankt zwischen 1—3 Teilstrichen. Aus der zweiten Messung kann man auch ersehen, daß durch Wasserzufuhr die Centralpalte, nachdem sie verschlossen gewesen, sogar sich noch weiter öffnen kann, als dies vor dem Verschlusse der Fall gewesen, welche Tatsache mir mehrmals begegnete.

Aus diesen Vorgängen erhellt wenigstens so viel, daß jedenfalls ein Hauptagens des Öffnens und Schließens dieser dem Lichte entzogenen Stomata das Wasser bildet, d. h. größere Feuchtigkeit wird diese Spaltöffnungen öffnen, während sie sich bei einem gewissen Grade von Trockenheit schließen werden.

Ich prüfte auch, ob die Schließzellen für temperiertes oder lauwarmes Wasser empfindlicher wären als für kaltes, doch konnte ich durchaus keine Steigerung der Empfindlichkeit wahrnehmen. Ferner brachte ich Rhizome, die schon geraume Zeit dem Waldboden enthoben waren, und an denen ich keine offenen Apparate mehr fand, während 12 Stunden in feuchte Luft und Dunkelheit bei einer Temperatur von ungefähr

15—18°. Als ich hernach von diesen Wurzelstöcken Schnitte beobachtete, konnte ich ziemlich viele offene Stomata wahrnehmen.

Bei den Versuchen mit verdünntem Glycerin fiel mir besonders auf, daß die Schließzellen beim Öffnungsvorgange längst wieder ihren Turgor gewonnen hatten, als in den benachbarten Epidermiszellen noch Plasmolyse herrschte. Es rührt das vielleicht zunächst daher, daß die Membranen der Schließzellen dem Wasser leichter zugänglich sind, als die der Epidermiszellen; vermutlich enthalten aber die erstern auch eine endosmotisch sehr wirksame Substanz. Dieses Experiment des Verschlusses mittels Zusatz von Glycerin kann selbstverständlich auch an chlorophyllhaltigen Schließzellen gemacht werden; doch gelang es mir nie, durch Zusatz von Wasser auf diese Weise geschlossene Stomata von Blättern unmittelbar nachher wieder zu öffnen, wiewohl die Plasmolyse aufgehoben war. Demnach liegt also bei den betreffenden unterirdischen Stomata ein Moment vor, welches die Wasseraufnahme beschleunigt.

Konnte ich auch die Frage nach den physiologischen Ursachen, welche das Öffnen und Schließen unterirdischer Spaltöffnungen bewirken, nicht erschöpfend und vollständig lösen, so kann ich dennoch folgende Tatsachen aus den vorausgegangenen Untersuchungen feststellen:

1. An den Rhizomen von *Polygonatum multiflorum* und *Convallaria maialis* gibt es nebst einer großen Zahl funktionsloser auch tätige Stomata, welche aber selbst bei der größten Öffnung nur eine kleine Centralpalte aufweisen.

2. Bei diesen unterirdischen Spaltöffnungen sind die Schließzellen nicht mit Chlorophyll besetzt, son-

dern sie enthalten vor allem Stärke; ob sie sonst noch chemische Verbindungen enthalten, bleibt dahingestellt. Das Licht, welches die erste Ursache des Öffnens der Stomata oberirdischer, grüner Organe ist, kann also hier selbstredend keine Rolle spielen.

3. Wasserzufuhr bei bestimmten Temperaturverhältnissen bewirkt Turgor in den Schließzellen und somit Öffnung derselben, während Wasserverlust die Stomata schließt. Die Frage, ob chemische Vorgänge, z. B. Stärkeauflösung durch Fermente, beim Öffnen und Schließen beteiligt sind, bleibt vorderhand noch offen.

Es wäre nun allerdings auch interessant gewesen,




Fig. 39. Spaltöffnung am Rhizom von *Mercurialis perennis*, a Flächenansicht, b Querschnitt.

zu untersuchen, ob die Stomata an den Rhizomen *dicotylar* Pflanzen das gleiche Verhalten zeigen, wie diejenigen der *Monocotylen*. Ich habe indessen nur mit dem Studium des Baues der Spaltöffnungen am Rhizom von *Mercurialis perennis* begonnen und gefunden, daß dieselben alle in der gleichen Richtung orientiert sind und zwar in der Richtung der Längsachse des Rhizoms. Der Typus stimmt mit demjenigen an Blatt und Stengel überein, doch sind die Verdickungen der Schließzellen weit geringer (Fig. 39).

Der Inhalt der letztern zeigt wie bei *Polygonatum* und *Convallaria* die Stärkereaktion. Leider hatte ich in vorgerückter Jahreszeit nicht mehr das Glück, offene Stomata zu finden, und so war es mir nicht mehr möglich, nach den Agentien des Öffnen und Schließens zu forschen. Da die Spaltöffnungen an diesem Rhizom sehr spärlich vorhanden sind, werden diesbezügliche Versuche längere Zeit in Anspruch nehmen.

V. KAPITEL.

Schwammgewebe.

Haberlandt¹⁷⁾ schreibt in seiner physiologischen Pflanzenanatomie dem Schwammgewebe drei Funktionen zu und zwar Zuleitung, Assimilation und Durchlüftung. Abgesehen von den Forschungen dieses Autors ist mir eine so eingehende anatomisch-physiologische Spezialarbeit über das Schwammparenchym nicht bekannt.

Die meisten Pflanzen, deren Schwammgewebe ich untersuchte, sind Schattenpflanzen aus dem Buchenwalde. Ein gemeinsames Merkmal des Schwammgewebes, das diese Schattenpflanzen auszeichnen würde, konnte ich nicht finden. Wohl dehnen sich die Arme der Schwammparenchymzellen fast bei allen diesem Standorte angehörigen Pflanzen in horizontaler Richtung aus, und nur selten trifft man Arme in der Richtung senkrecht zur Blattfläche, welches Verhältnis sich aber auch an Blättern, die dem direkten Sonnenlichte ausgesetzt sind, zeigt. Wenn überhaupt Schwammgewebezellen Arme senkrecht zur Blattfläche ausenden, so sind sie in der Regel sehr kurz, wie z. B. im Sonnenblatt von *Fagus sylvatica*. Eine Ausnahme hiervon macht allerdings die Gefäßkryptogame *Aspidium Filix mas*, über welche ich weiter unten sprechen werde.

Ein erster Punkt, auf den ich infolge meiner Beobachtungen hinweisen möchte, ist ein Unterschied zwischen den untersuchten *Monocotyledonen* und *Di-*

cotyledonen. Wenn wir Schwammgewebezellen von *Monocotylen* und *Dicotylen* auf dem Querschnitte eines




Fig. 40. Schwammgewebe: a von *Ranunculus acer*, b von *Polygonatum multifl.* c von *Platanthera bifolia*.

Blattes nebeneinander betrachten, so werden wir keinen großen Unterschied wahrnehmen, wenn wir sie aber auf

Flächenschnitten mit einander vergleichen, so werden wir in vielen Fällen aus der Form der Zellen und der relativen Größe der Intercellularräume die *Monocotyle* von der *Dicotyle* unterscheiden können; wir werden sagen können, ein gewisser Bau des Schwammgewebes ist nur einem *monocotylen* Blatte eigen und wird nie oder selten bei einem *dicotylen* zu finden sein.

Die Schwammgewebezellen der *Dicotylen* verraten in horizontaler Ausdehnung durchaus keine bevorzugte Streckungsrichtung, sie entfalten ihre Arme nach allen Seiten gleichmäßig (Fig. 40 a). Die Zellen der *Monocotylen* hingegen zeigen in vielen Fällen in irgend einer Richtung eine vorwiegende Streckung. Wenn wir z. B. die Schwammparenchymzellen zwischen zwei Gefäßbündeln von *Cephalanthera pallens* auf einem Flächenschnitte ins Auge fassen, so sehen wir, daß die einzelnen Schwammgewebezellen nach verschiedenen Richtungen gestreckt sind. Bekanntlich stehen diese Zellen im Dienste der Stoffleitung; die erste und zweite Reihe der an die Gefäßbündel angrenzenden Zellen sind deshalb in der Richtung der letztern gestreckt, dann folgen zwei Reihen, die quer dazu orientiert sind, und in der Mitte verläuft wieder eine mit Längsrichtung. Bei *Galanthus nivalis* und *Platanthera bifolia* (Fig. 40 c) sind die Schwammparenchymzellen alle nach der Längsachse des Blattes gestreckt.

Bei *Carex remota* sind isodiametrische Zellen ebenfalls in Reihen angeordnet, aber jene, welche die Atemhöhlen begrenzen, besitzen langgestreckte Form und heben sich deutlich ab von den übrigen, angrenzenden Zellformen (Fig. 41 a).

Diese Anordnung der Schwammgewebezellen in Reihen und die damit verbundene, vorwiegende Streckung findet sich bei langen schmalen Blättern,

welche den *Monocotylen* vielfach charakteristisch find.
Sobald aber das Blatt *monocotylar* Pflanzen eine brei-




Fig. 41. Schwammgewebe: a. von *Carex remota*.
b. von *Convallaria maialis*.

tere Form besitzt, wobei das Verhältniß der Länge zur Breite 3:2 oder gar 1:1 ist, wie z. B. bei *Paris quadrifolia*, *Smilacina bifolia*, *Tamus communis*, so zeigt sich keine bevorzugte Streckungsrichtung der Schwammgewebezellen mehr, sondern sie senden ihre Arme wie die der *Dicotylen* in horizontaler Richtung nach allen Seiten gleichmäßig aus, so daß man einzig aus der Form der Zellen nicht mehr auf die Abtheilung der *Monocotylen* schließen kann (Fig. 42 a, b, c).

Es zeigt sich auch hierin wieder, daß die Gewebe eines *monocotylen* Blattes weit empfindlicher find, als

das bei den *Dicotylen* der Fall ist, indem die Zellformen eine solche Abhängigkeit von einer bestimmten



Fig. 42. Schwammgewebezellen: a. von *Paris*, b. von *Smilacina*, c. von *Tamus*.

Organform zum Ausdruck bringen. Ein Blatt so schmal, wie *Helleborus foetidus* es besitzt, zeigt in Bezug auf die Richtung der Schwammgewebezellen das gleiche Bild, wie z. B. *Plantago maior* oder *Oxalis acetosella*, deren Blätter rundlich sind (Fig. 43 a und b). Während also bei den *Monocotylen* die Form des Blattes sowohl auf den Spaltöffnungstypus, als auch auf die Form

und Richtung der Schwammgewebezellen einen Einfluß hat, ist das beim *dicotylen* Blatt nicht der Fall.



Fig. 43. Schwammgewebe: a. von *Helleborus*, b. von *Oxalis*.

Wenn nun auch gewisse Blätter der *Monocotylen* infolge ihrer Breite in den Schwammgewebezellen keine irgendwie bevorzugte Streckungsrichtung erkennen lassen, so sind dennoch die Interzellularräume stets

von relativ geringerer Größe als bei den *Dicotylen*. Damit find wir bei einem zweiten Punkte angelangt.

Paris, *Platanthera*, *Smilacina*, *Tamus* (Fig. 40 c, 42 a, b, c und 43) werden z. B. niemals so große Inter-




Fig. 44. Schwammgewebe: a. von *Hedera Helix*, b. von *Hepatica triloba*.

lularräume aufweisen, wie sie im Schwammgewebe von *Hedera Helix* (Fig. 44a), *Oxalis acetosella*, *Hepatica*

triloba (Fig. 44b), *Pulmonaria obscura* u. f. w. vorkommen.

Diese Erscheinung hat, wie ich annehmen möchte, ihren Grund in der Tatsache, daß das Palissadengewebe bei den *Monocotyledonen* an der Durchlüftung einen bedeutend größern Anteil nimmt als bei den *Dicotyledonen*. Im Palissadengewebe der letztern gibt es viele, sehr kleine, gleichsam auf das physiologische Minimalmaß beschränkte Interzellularräume, die infolge der Zusammengrenzung cylindrischer Zellen entstehen. Die Palissadenzellen der *Monocotylen* besitzen aber oft Einbuchtungen, oder ihre Membranen sind gewellt, und so können sich weit mehr und größere Interzellularräume bilden. Weil somit das Palissadengewebe der *Monocotylen* an der Durchlüftung stärker beteiligt ist, als das der *Dicotylen*, so scheint in Korrelation dazu das Schwammgewebe der *Monocotylen* nicht so große Interzellularräume nötig zu haben, wie das der *Dicotylen*.

Diese Bildung großer Interzellularräume im Schwammgewebe *dicotyler* Pflanzen wird auf verschiedene Art erzielt, z. B. durch langarmige Zellen, oder bei kurzarmigen durch Verlängerung der Arme mittelst eingeschalteter Zellen etc. Der Deutlichkeit halber will ich einige Spezialfälle anführen.

Hedera Helix (Fig. 44a) zeigt in der Flächenausdehnung eines der reichgegliedertsten Schwammgewebe; es ist dünnarmig und weitmaschig. Die Zellen sind nur ein- bis vierarmig; die häufigste Form ist die dreiarmlige, welche bei kleinem Centalkörper und mäßig gestreckten Armen dadurch eine leichte Gliederung ermöglicht, daß oft geradlinige, gestreckte Zellen eingeschoben sind, welche zur Verlängerung der Zellarme dienen. Dadurch werden große Interzellularräume er-

reicht. Gewöhnlich find es 6—7 Zellen, welche einen Interzellularraum umgeben. Über jedem Interzellularraum der untersten Schwammgewebeschicht liegt in der Regel eine Spaltöffnung.

Daß das Epheublatt in so hohem Maße für ausgiebige Durchlüftung eingerichtet ist, verstehen wir teleologisch, wenn wir uns vorstellen, wie es am Stamme der Buche mit feiner Unterseite dem Substrat beinahe anliegt. Denn das Blatt ist infolge seiner Lage einerseits dem Winde weniger ausgesetzt als ein frei in




Fig. 45. Schwammgewebe: a. von *Galium Mollugo*, b. von *Viola filvatica*.

der Luft schwebendes, und deshalb können die zur Affimilation und Atmung notwendigen Gase nicht mit der gleichen Intensität herzufließen; andererseits ist ein solches Blatt weniger der Gefahr allzu starker Verdunstung preisgegeben, und die großen Atemhöhlen, welche im allgemeinen eine stärkere Transpiration im Gefolge haben, werden der Pflanze nicht zum Nachtheile fein.

Oxalis acetosella, *Galium Mollugo*, *Viola filvatica*, *Daphne Mezereum*, *Aquilegia vulgaris* zeigen in Bezug auf feine Gliederung und Größe der Inter-



Fig. 46. Schwammgewebe: a. von *Orobis vernus*, b. von *Anemone nemorosa*.

cellularräume demjenigen von *Hedera Helix* ähnlich gebaute Schwammgewebe, doch unterscheiden sie sich in den Formen der einzelnen Zellen. An Stelle der dreiarmligen Zellen, welche für *Hedera*, *Aquilegia* u. a. charakteristisch sind, treten nämlich reichverzweigte, 3—7 armige bei *Galium* (Fig. 45 a), 5—6 armige bei *Oxalis* (Fig. 43 b), 3—6 armige bei *Viola* (Fig. 45 b).

Orobus vernus besitzt ebenfalls reichgegliederte, aber kurzarmige Zellen (Fig. 46 a), die 6—8 Ansatzstellen aufweisen. Bei den Schwammparenchymzellen von *Anemone nemorosa* fand ich die größte Zahl von Ar-




Fig. 47. Schwammgewebe: a. von *Vinca minor*, b. *Fragaria elatior*, c. *Primula elatior*.

men und Ansatzstellen, und zwar kann man deren oft 10—12, mitunter noch mehr zählen, wie aus der Fig. 46b zu ersehen ist.

Mäßige voluminöse Zellen sind *Hepatica triloba* (Fig. 44 b), *Helleborus foetidus* (Fig. 43 a) und *Pulmonaria obscura* eigen. Kurzarmige Schwammgewebezellen, die aber durch ihre Lagerungsweise dennoch ansehnliche Interzellularräume bilden, besitzt *Vinca minor* (Fig. 47 a), kurzarmige Zellen und kleinere Interzellularräume kommen *Fragaria elatior* (Fig. 47b) und *Primula elatior* zu (Fig. 47 c).

Von den bis jetzt erwähnten Formen der Schwammparenchymzellen, wie auch vom Gesamtaufbau des Gewebes, hebt sich deutlich ab Zellform und Bau des Gewebes von *Aspidium Filix mas*. Es hat nicht nur in der Richtung der Blattfläche ein reichverzweigtes Schwammparenchym mit großen Interzellularräumen, sondern ebenso in der Richtung senkrecht zur Blattfläche (Fig. 48 b).

Die Bedeutung dieser Erscheinung läßt sich vielleicht erklären an der Hand der Lehre von J. Sachs, welche Godlewski¹⁸⁾ bestätigt und erweitert hat. Letzterer bewies, «daß in einer Atmosphäre, welche keine Kohlenfäure enthält, auch keine Stärke in den Chlorophyllkörnern am Lichte erzeugt wird. Ebenso fand er, daß die im Chlorophyll entstandene Stärke nicht bloß im Finstern, sondern auch bei intensivem Licht verschwindet, wenn die umgebende Luft keine Kohlenfäure enthält. Von ganz besonderm Gewichte aber ist die Tatsache, daß eine Steigerung des Kohlenfäuregehaltes der Luft bis 8% bei intensivem Lichte eine 4—5 mal ausgiebigere Stärkebildung bewirkt, während im diffusen Licht die Wirkung viel geringer ist; sehr große Kohlenfäuremengen in der Luft hindern

dagegen die Stärkebildung um fo mehr, je geringer die Lichtintensität ist».



Fig. 48. a. Schwammgebe von *Aspidium Filix mas* (Flächenansicht).
b. Querschnitt durch das Blatt von *Aspidium Filix mas*.

Es dürfte deshalb wohl die Annahme richtig sein, daß auch gerade deshalb die Schattenpflanzen, vorab

die Farne, ein reichdifferenziertes Schwammgewebe haben, und zwar letztere auch in der Richtung senkrecht zur Blattfläche, um durch die dadurch gebildeten, geräumigern Interzellularräume der Kohlenfäure möglichst reichen Zutritt zu gewähren, weil die Beleuchtung des schattigen Waldes weniger intensiv ist; damit wird also die Leistungsfähigkeit der Chlorophyllkörner durch die Einwirkung reichlicher Kohlenfäure möglichst gesteigert.

Bekanntlich besitzen ferner die Epidermiszellen der Blattunterseite von *Aspidium Filix mas* Chlorophyll. Der Pflanze wird deshalb eine ausgiebige Durchleuchtung vom größten Vorteil sein, und dies ist wohl ein zweiter Grund für die Differenzierung des Schwammgewebes senkrecht zur Blattfläche, denn das schief auffallende, diffuse Tageslicht kann ein derart gebautes Schwammparenchym leichter durchdringen, als wenn die Zellen nur in horizontaler Richtung gegliedert sind, zumal bei letzterer Konstruktion die Interzellularräume oberer und unterer Schwammgewebeschichten in der Regel etwas gegen einander verschoben sind.

Endlich trägt das Farnblatt auf seiner untern Seite die Sporen. Es werden deshalb die Arme der Schwammparenchymzellen senkrecht zur Fläche vorab auch in dieser Richtung im Dienste der Stoffleitung stehen, und das wäre, abgesehen von der Atmung, ein dritter physiologischer Grund für die Orientierung der Zellarme senkrecht zur Blattfläche.

Nach diesen Erörterungen möchte ich noch die Tatsache anführen, daß mit ihren Blättern überwinternde Pflanzen, wie *Hedera Helix*, *Vinca minor*, *Hepatica triloba*, *Helleborus foetidus* insofern eine Übereinstimmung zeigen, daß die Zellen der untersten Schichten des Schwammgewebes Membranen

von bedeutender Dicke besitzen. Man kann dies deutlich sehen, wenn man querdurchschnittene Zellarme, welche direkt gegen den Beobachter gerichtet sind, betrachtet. Bei nicht überwinternden Blättern konnte ich niemals die betreffenden Zellwände von solcher Dicke beobachten. Wenn man genau zusieht, so zeigt sich, daß die Dicke der Membranen bei diesen überwinternden Pflanzen von den Palissaden- bis zu den untersten Schwammparenchymzellen zunimmt. Vom Spätherbste bis zum Frühlinge sind es nun vorab diese untersten Schwammgewebezellen, welche als Speicherorgane der Nährstoffe dienen. Es scheint daher die Verdickung der Zellmembranen eine sehr zweckmäßige Einrichtung zu sein. Denn während dieser Zeit ist die Pflanze einem mannigfaltigen Witterungswechsel unterworfen, auf milde sonnige Tage folgen solche von intensiver, anhaltender Kälte. Es kann deshalb dem Schwammparenchym nur zum Vorteil gereichen, wenn die Membranen seiner Zellen, welchen für diese Zeit die Funktion der Speicherung zukommt, derb und widerstandsfähig gebaut sind.

Zum Schlusse möchte ich die hauptfächlichsten Resultate vorliegender Arbeit kurz zusammenfassen.

I. Es gibt Spaltöffnungsapparate, welche als Modifikationen der bereits von Schwendener, Haberlandt und Schellenberg aufgestellten mechanischen Typen hingestellt werden müssen.

1. Modifikation des *Helleborus*-Typus ausgezeichnet durch Berührung der Hörnchen im geschlossenen Zustande.
2. Modifikation: An *Iris germanica* erinnernder Typus bei *Onobrychis fativa*.
3. *Mnium* ähnlicher Typus bei *Oleandra nerifolia*.
4. Modifikation des *Tradescantia*-Typus bei *Smilax mauritanica*.
5. An den Schwimmpflanzen erinnernder Bau der Schließzellen bei *Primulaceen* und *Ranunculaceen*.

Bau und Mechanismus der Spaltöffnung am Stengel von *Ranunculus acer* charakterisierte ich als einen neuen Typus. Denn abweichend von den früher besprochenen Typen ist nicht bloß das Fehlen äußerer und innerer Gelenke, sondern vor allem die auffallende Dicke der innern Wand der Nachbarzelle und endlich damit im Zusammenhang beim Eintreten des Turgors der Zug schief nach innen, den diese dicke Innenwand infolge der Ausdehnung der dünnwandigen, die Atemhöhle begrenzenden Zellen ausübt.

II. Bezüglich der anatomischen Unterschiede der Spaltöffnungen am gleichen Organe und an verschiedenen Organen derselben Pflanze sind folgende Fälle hervorzuheben:

a. Verschiedenheiten zwischen den Stomata derselben Blattseite.

b. Verschiedenheiten zwischen den Stomata der Blattoberseite und der Blattunterseite; diese beziehen sich auf Bau und Einfenkung der Schließzellen.

c. Verschiedenheiten zwischen den Stomata von Blatt und Stengel derselben Pflanze.

α) Allgemeine Verschiedenheiten: Schließzellen beim Stengel in der Regel länger, höher, schmaler als beim Blatt; öfterer Doppelverschluß.

β.) Spezielle Verschiedenheiten: Hauptfächlich bezüglich des Bautypus in Stengel und Blatt.

III. Momente, welche bei der Verteilung der Spaltöffnungstypen bei den *Monocotylen* in Betracht kommen, sind im folgenden namhaft gemacht.

1. Die systematische Verwandtschaft.
2. Die Organform (Blattform).
3. Die Umrißform der Spaltöffnung, auf den Flächenschnitt bezogen.
4. Der Standort.

IV. An den Rhizomen von *Polygonatum multiflorum* und *Convallaria maialis* gibt es nebst einer Anzahl funktionsloser, auch tätige Stomata, welche aber selbst bei der größten Öffnung nur eine kleine Centralpalte aufweisen. Die Funktionslosigkeit ist durch spezifische anatomische Einrichtungen nachweisbar. Bei diesen unterirdischen Spaltöffnungen sind die Schließzellen nicht mit Chlorophyll besetzt, sondern sie enthalten vor allem Stärke. Wasserzufuhr bei bestimmten Temperaturverhältnissen bewirkt Turgor in den Schließzellen und Öffnung derselben, während Wasserverlust die Stomata schließt.

V. Die Schwammgewebezellen vieler *Monocotyledonen* zeigen eine bevorzugte Streckungsrichtung, was bei den *Dicotylen* nicht der Fall ist. Besitzt das *Monocotylen*blatt breitere Form (*Tamus*, *Smilacina*), dann ist eine vorwiegende Streckungsrichtung nicht vorhanden.

Die Intercellularräume im Schwammgewebe sind bei den *Dicotylen* im allgemeinen größer als bei den *Monocotylen*, was durch Korrelation erklärbar ist, nämlich durch Vergleich mit dem Palissadengewebe.

Vorliegende Arbeit wurde im botanischen Institute der Universität Freiburg (Schweiz) unter der Leitung des Herrn Prof. Dr. Westermaier ausgeführt; für die Förderung und Ratschläge von Seite dieses verehrten Lehrers spricht der Verfasser hier seinen herzlichsten Dank aus.



Anmerkungen.

¹⁾ S. Schwendener, Über Bau und Mechanik der Spaltöffnungen. Monatsbericht der königl. Akademie der Wissensch. zu Berlin, 1881, p. 857.

²⁾ G. Haberlandt, Physiologische Pflanzenanatomie. Leipzig 1896, p. 390.

³⁾ E. Büniger, Beiträge zur Anatomie der Laubmooskapfel. Inaug.-Diff. Bot. Centralb. 1890, Bd. XLII.

⁴⁾ G. Haberlandt, Physiologische Pflanzenanatomie. Leipzig 1896, p. 401.

⁵⁾ H. C. Schellenberg, Beiträge zur Kenntnis von Bau und Funktion der Spaltöffnungen. Botan. Ztg. I. Abt., Heft X., Leipzig 1896.

⁶⁾ G. Haberlandt «Zur Kenntnis des Spaltöffnungsapparates,» II. die Spaltöffnungen der Schwimmpflanzen. Flora 1887.

⁷⁾ G. Haberlandt, Physiologische Pflanzenanatomie, p. 401.

⁸⁾ W. Benecke, Die Nebenzellen der Spaltöffnungen. Ing.-Diff. Jena 1892, p. 22.

⁹⁾ G. Haberlandt, Physiologische Pflanzenanatomie. S. 396 ff.

¹⁰⁾ H. Solereder, Systematische Anatomie der Dicotyledonen 1899. S. 912.

¹¹⁾ M. Raciborski, Die Pteridophyten der Flora von Buitenzorg, 1898. S. 108.

¹²⁾ K. Giefenhagen, Die Farngattung *Niphobolus*, Eine Monographie, Jena 1901. S. 81 und 85.

¹³⁾ A. Guillaud, Thèses présentées à la Faculté des sciences de Paris. I. Thèse, Recherches sur l'Anatomie comparée et le développement des Tissus de la Tige des Monocotyledones, Paris, 1878. S. 21 und 52.

¹⁴⁾ R. Hohnfeldt, Über das Vorkommen und die Verteilung der Spaltöffnungen auf unterirdischen Pflanzenteilen, Inaugural-Differtation, Königsberg 1880. Just 8. Jahrgang.

¹⁵⁾ J. Costantin, Étude comparée des tiges aériennes et souterraines des Dicotyledones, Paris 1883, aus Ann. des sciences naturelles. 6. sér., T. XVI.

¹⁶⁾ L. Heydrich, Beiträge zur vergleichenden Anatomie einiger Zwiebelgewächse, Inaugural-Differtation, Halle-Wittenberg, 1890.

¹⁷⁾ G. Haberlandt, Physiologische Pflanzenanatomie. S. 247.

¹⁸⁾ Godlewski, Abhängigkeit der Stärkebildung in den Chlorophyllkörnern von dem Kohlenfäuregehalt der Luft; Flora 1873, S. 378. Abhängigkeit der Sauerstoffabcheidung der Blätter von dem Kohlenfäuregehalt der Luft in «Arbeiten des botan. Inst. in Würzburg». 1873. Bd. I. S. 343.



Vita.

Der Verfasser vorliegender Arbeit wurde den 3. Oktober 1871 in Rieden bei Baden (Schweiz) geboren als Sohn von Robert und Friedrika Buck. Nachdem er die Volksschule und drei Klassen der Bezirksschule Baden absolviert hatte, machte er vom Herbst 1887 bis Sommer 1892 feine Studien am Gymnasium und Lyceum des Stiftes Einsiedeln, wonach er das Reifezeugnis erlangte. Im September 1892 trat er in das Noviziat des Benediktinerklosters Einsiedeln und nach dessen einjähriger Dauer studierte er vier Jahre Theologie. Im Juni 1897 wurde er zum Priester geweiht. Während des Schuljahres 1897/98 war er Lehrer der I. Gymnasialklasse an der Stiftsschule Einsiedeln. Im Oktober 1898 wurde er an der Universität Freiburg in der Schweiz immatrikuliert und hörte Vorlesungen über Botanik, Mineralogie, Geologie, Zoologie, Experimentalphysik, mathematische Behandlung der Naturwissenschaften, anorganische und organische Chemie bei den Herren Professoren *Westermaier*, *Baumhauer*, *de Girard*, *Kathariner*, *von Kowalski*, *Daniëls* und *Thomas-Mamert*. Nach vier Semestern erlangte er das Licentiats-Diplom und legte am Ende des siebenten Semesters der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät die vorliegende Arbeit als Inaugural-Dissertation vor.

Den genannten Herren Professoren spricht der Verfasser an dieser Stelle seinen tiefgefühlten Dank aus.
